

Hvede og triticale efterår 2024

***Vores anbefaling er især med Mateno Duo og Boxer.**

Den løsning har virkning på grovere græsser og storkehejrenæb, kornblomster, kamille, resistent fuglegræs m.v.

Alt i alt bedre og bredere løsning.

Eftermiddag/aften-sprøjtning foretrækkes med Boxer !

***Vær ekstra opmærksom på snegle i år**

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 16-17			
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajrgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,1 - 0,15 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning , meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Boxer-dosis øges hvis udfordringer med besværlige græsarter som agerrævehale, ital. rajrgræs m.v. Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 11: Boxer + evt. Trimmer SG + Spredeklæbemiddel SP50	1,0-1,5 ltr. + 7 g + 0,15 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajrgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr.	Anvendes Trimmer SG som opfølgning mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredeklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	Der kan tilføres mangan og evt. middel mod blad- lus i st. 13 sammen med Trimmer SG efter behov.
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajrgræs, spildraps, storke-/hejrenæb, kornblomster, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer	0,35-0,5 ltr. + 0,75-1,0 ltr.	Højeste dosis Mateno Duo hvis kornblomster. OBS. Maks. 0,35 ltr./ha Mateno Duo i vinterrug og vinterbyg. Mateno Duo må ikke blandes med Boxer/Roxy EC i vinterrug og vinterbyg.
Rajrgræs (stor bestand), væselhale, agerrævehale, vindaks, enårig rapgræs, spildraps, storke-/hejrenæb, kornblomster, resistent fuglegræs, valmuer og kamiller samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer	0,5-0,7 ltr. + 1,0-1,5 ltr.	Anvend højest angivne dosis Boxer og Mateno Duo og følg op med Atlantis OD hvis væselhale og/eller meget rajrgræs.
	Opfølgning efter behov: Atlantis OD	0,5-0,75 ltr.	Opfølgning med 0,2 ltr./ha Topik + 0,5 ltr./ha Renol er stærkere mod spildkorn af byg/havre end Atlantis OD, men har ingen effekt mod væselhale.

Hvede og triticales efterår (forts)

Skadedyder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Skadedyr			
Bladlus	Kaiso Sorbie eller Mavrik	0,1 kg -0,1 ltr.	Ved fund eller varsel. Maks. 1 behandling med Mavrik om efteråret, og maks. 1 behandling med Kaiso Sorbie pr. vækstår.
Snegle	Ironmax Pro Eller Sluux	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende - især ved udsider og på knoldede, lerede områder i markerne. Gentagne behandlinger kan være nødvendig. Se produktside for vejledning.
Bygfluer og aksløberlarver	Lamdex (Mindre anvendelse)	0,2 kg/ha	Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse ved brug af Lamdex mod byg- fluer og aksløberlarver i vintersæd. Kan anvendes i september-oktober i kornets st. 11-12. Vær især opmærksom på lokaliteter, hvor der i foregående år har været større angreb. Lamdex vil samtidig have effekt mod tidlige angreb af bladlus.
Mikronæring			
Forebyggelse af mangan-mangel	Mangannitrat 235 + spredklæbemiddel SP50	1 - 1,5 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende og efter behov ved nytivækst. Spredklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
Magnesium, mangan, kobber og zink	YaraVita GRAMITREL	1,0 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO MicroTop + Mangannitrat 235 + Spredklæbemiddel SP50	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse. 1,0-1,5 kg/ha EPSO Mikrotop kan med fordel tilsættes flere gange i sæsonen.

Rug efterår 2024

Vores anbefaling er især med Mateno Duo og Boxer.

Den løsning har virkning på grovere græsser og storkehejrenæb, kornblomster, kamille, resistent fuglegræs m.v.

Alt i alt bedre og bredere løsning

Bland ALDRIG Mateno Duo og Boxer i rug

Sprøjt Mateno Duo så snart rugen er ændret fra lilla til grøn.

Eftermiddag/aften-sprøjtning foretrækkes med Boxer !

***Vær ekstra opmærksom på snegle i år**

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 16-17			
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,08 - 0,15 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning , meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Opfølgning med Boxer på kornets st.11. Boxer-dosis øges hvis udfordringer med besværlige græsarter som agerrævehale m.v. Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler til foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 11: Boxer + evt. Trimmer SG	1,0-1,5 ltr. + 7 g	
Enårig rapgræs, vindaks, spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt lidt rajgræs, agerrævehale og væselhale	St. 10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterrug og vinterbyg skal Mateno Duo og Boxer/ Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 l/ha i vinterrug og vinterbyg. Rette timing af behandlingen er vigtig. Højeste dosis Boxer/Roxy EC ved meget rajgræs og agerrævehale. Er der væsel- hale anbefales yderligere opfølgning med maks. 0,45 ltr./ha Atlantis OD i st. 12-13. Atlantis OD kan være hård ved rugen.
	Opfølgning st. 11: Boxer	1,0-2,0 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05 ltr.	Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps i efteråret, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Cossack OD til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller lusemiddel til Trimmer SG.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	
Rajgræs, agerrævehale, spildkorn af havre/vårbyg, enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer + Legacy 500 SC	1,5-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Mindst 2,0 ltr./ha Boxer/Roxy EC for at fore- bygge resistens mod agerrævehale. Opfølgning i efteråret med Topik på nyfremspiret græsukrudt/spildkorn af vårbyg/havre.
	Opfølgning st. 12-13: Topik + Renol	0,2 ltr. + 0,5 ltr.	

Rug efterår (forts)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Skadedyr			
Bladlus	Kaiso Sorbie eller Mavrik	0,07-0,1 kg 0,07-0,1 ltr.	Ved fund og varsel. Maks. 1 behandling med Mavrik om efteråret og maks. 1 behandling med Kaiso Sorbie pr. vækstår.
Snegle	Ironmax Pro Eller Sluxx	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende - snegle kan være meget hårde i rug og kan hurtigt ødelægge afgrøden. Anvendes især ved udsider og på knoldede, lerede områder i markerne. Gentagne behandlinger kan være nødvendig. Se produkt- side for vejledning.
Bygfluer og aksløberlarver	Lamdex (Mindre anvendelse)	0,2 kg	Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse ved brug af Lamdex mod bygfluer og aksløberlarver i vintersæd. Anvendes i september-oktober på kornets st. 11-12. Vær især opmærksom på lokaliteter, hvor der i foregående år har været større angreb. Lamdex vil samtidig have effekt mod tidlige angreb af bladlus.
Mikronæring			

Forebyggelse af mangan- mangel	Mangannitrat 235 + spredelæbemiddel SP50	1 - 1,5 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende og efter behov ved nytilvækst. Spredelæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
Magnesium, mangan, kobber og zink	YaraVita GRAMITREL	1,0 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO MicroTop + Mangannitrat 235 + Spredelæbemiddel SP50	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse. 1,0-1,5 kg/ha EPSO Mikrotop kan med fordel tilsættes flere gange i sæsonen.

Vinterbyg efterår 2024

Vores anbefaling er især med Mateno Duo og Boxer.

Den løsning har virkning på grovere græsser og storkehejrenæb, kornblomster, kamille, resistent fuglegræs m.v.

Alt i alt bedre og bredere løsning

Bland **ALDRIG** Mateno Duo og Boxer i vinterbyg

Eftermiddag/aften-sprøjtning foretrækkes med Boxer !

***Vær ekstra opmærksom på snege i år**

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt			
Enårig rapgræs, vindaks, rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burrenerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning , meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Anvend højeste dosis Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs og agerrævehale. Anvendes 7 g/ha Trimmer SG som opfølgning mod tokimbladet ukrudt, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Trimmer SG og Nicanor SG til foråret.
	Opfølgning st. 11-12: Boxer + evt. Trimmer SG	1,0-2,0 ltr. + 7 g	
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs, meget spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 9-10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterbyg og vinterrug skal Mateno Duo og Boxer/Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 ltr./ha i disse afgrøder. Rette timing af behandlingen er vigtig. Anvend højeste dosis Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 11: Boxer	1,0-2,0 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burrenerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer + Legacy 500 SC	1,0-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Anvend højeste dosis Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs. Anvendes 7 g/ha Trimmer SG som opfølgning mod tokimbladet ukrudt kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Trimmer SG og Nicanor SG til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller luse- middel efter behov i den opfølgende behandling.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredeklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	
Skadedyr			
Bladlus	Kaiso Sorbie	0,07-0,1 kg	Ved fund eller værsel. Maks. 1 behandling om efteråret med Mavrik og maks. 1 behandling pr. vækstår med Kaiso Sorbie.
	eller Mavrik	0,07-0,1 ltr.	

Vinterbyg efterår (forts)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Skadedyr			
Snegle	Ironmax Pro Eller Sluux	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende - især langs kanter og på knoldede, lerede områder i markerne. Gentagne behandlinger kan være nødvendig. Se produktside for vejledning.
Bygfluer og aksløberlarver	Lamdex (Mindre anvendelse)	0,2 kg	Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse ved brug af Lamdex mod bygfluer og aksløberlarver i efteråret i vintersæd. Anvendes i september-oktober på kornets st. 11-12. Vær især opmærksom på lokaliteter, hvor der i foregående år har været større angreb. Lamdex vil samtidig have effekt mod tidlige angreb af bladlus.
Mikronæring			
Forebyggelse af manganmangel	Mangannitrat 235 + spredeklæbemiddel SP50	1 - 1,5 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende og efter behov ved nytillvækst. Spredetklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
Magnesium, mangan, kobber og zink	YaraVita GRAMITREL	1,0 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO MicroTop + Mangannitrat 235 + Spredetklæbemiddel SP50	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.