



Snart tid til bekæmpelse med Kerb 400 SC

Kerb 400 SC bekæmper blandt andet spildkorn, enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale samt andre kulturgræsser og har sideeffekt mod fuglegræs.

Godkendelsen af Kerb 400 SC betinger, at der kun kan behandles i november og december. Når jordtemperaturen nærmer sig 10°C og forbliver på samme niveau eller falder yderligere, er det relevant at behandle med Kerb 400 SC. Modstandsdygtigheden i græsukrudtet øges med ukrudtets størrelse. Derfor anbefales behandling så snart jordtemperaturen er ca. 10°C. Her har Kerb 400 SC en tilstrækkelig langtidseffekt i jorden og påvirkes ikke af en kortere periode med højere jordtemperatur.

I de tilfælde hvor Belkar-behandlingen endnu ikke er udført, kan Belkar og Kerb blandes. Dette gælder både hvis det er den fulde Belkar-dosering eller den sidste split af en splitstrategi der mangler. Bemærk, at doseringen af Belkar bør være 0,5 l/ha hvis den køres sammen med Kerb og ikke er en del af en splitstrategi.

Dosering af Kerb 400 SC

Dosering	Arter som bekæmpes med minimum 85% effekt
1.0 l/ha	Enårig og alm. rapgræs, vindaks, spildkorn af byg og havre, rødsvingel samt timothe.
1.25 l/ha	Agerrævehale, rajgræs, hundegræs, gold og blød hejre, væselhale, spildkorn af hvede, rug og tritiale, flyvehavre samt fuglegræs.

I marker med stort, meget eller resistent ukrudt anbefales altid 1.25 l/ha.

Sprøjteteknik

Kerb skal optages af rødderne og der stilles ikke specielle krav til god dækning. Brug derfor gerne grove dyser og høj vandmængde. Let regn under og lige efter udkørsel vil ikke reducere effekten.



Billede 1. Et dronfoto af et landsforsøg med bekæmpelse af væselhale. Parcellerne uden græsukrudt er alle behandlet med Kerb med rigtig god effekt. Parcellerne med græsukrudt er enten ubehandlet eller behandlet med clomazon. Ved meget store bestande af væselhale, kan man i enkelte tilfælde opleve, at effekten ikke er 100 %. Brug derfor fuld dosering og kørså snart jordtemperaturen er under 10 grader.



Billede 2 og 3: Et af de første symptomer på ukrudtet efter optagelse af Kerb, ses som opsvulmet stængelbasis ved jordoverfladen. Se ovenstående billeder illustreret med rajgræs og enårig rapgræs.

Blandinger

Kerb kan blandes med bl.a. insektmidler *eller* Belkar, hvis disse behandlinger ikke er afsluttet. 3-vejs mix er ikke afprøvet.

Vinterraps

Husk tilstrækkelig med bl.a. bor til rapsen inden væksten stopper. Vi anbefaler 1L Microcare Bor pr. ha. i løbet af efteråret + 2L Microcare Bor pr. ha. I foråret. (svarer til 500g ren bor pr ha.)

Vi anbefaler også at tilsætte 1-2 kg Epsø Microtop pr. ha. pr. kørsel.

Med venlig hilsen Mollerup Mølles Markservice