

## Afgrødenyt nr. 1

07-03-25

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Mangan til vintersæd
- Gødning til vintersæd
- Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
- Sprøjteteknik
- Ukrudtsbekæmpelse på veje og gårdspladser


### Mangan.

Der er kraftig manganmangel i mange af de vintersædsmarker, vi ser rundt omkring.

Det anbefales at køre nu med:

1-1,5L Mangannitrat 235 pr Ha.  
+1-3 kg Epso Microtop  
+ 0,15L SP 50 pr Ha.

Behandlingen gentages i hver uge



### Gødskning.

I farbare marker bør der tilføres gødning snarest. I Raps og vinterbyg tildeles 50 % af gødningen nu. I kraftige- og tidligt såede hvedemarker bør kvælstofmængden reduceres med 10-15 % Ellers tildeles 30-40% nu til hvede og rug. Brug gerne svovl- og ammoniumholdige gødninger.

### Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

#### REXADE 440 – midlet mod både græsser og bredbladet ukrudt

Rexade består af aktivstofferne fra Broadway og Zypar. Samtidig virker Rexade resistensforebyggende overfor fuglegræs og valmuer. Rexade må bruges om foråret i hvede, rug og triticale.

Rexade kan anvendes, når der er aktiv vækst og jordtemperaturen er over 5 grader C°. Hvide rodspidser indikerer, at væksten er i gang. Behandl aldrig i en periode med udbredt frost og dårlig vækst.

Er ukrudt og afgrøde i god vækst, betyder behandling i en periode med let morgenfrost ikke noget.

**I marker med ingen eller kun lidt fremspiret ukrudt, bør behandling afvente ny fremspiring**, som typisk sker senere på foråret.

Moderate bestande af enårig rapgræs bekæmpes tilfredsstillende med Rexade. Er arealet ubehandlet fra efteråret eller der er massive forekomster af enårig rapgræs, kan tilsætning af Atlantis OD være nødvendig for at sikre effekten. Mod agerrævehale eller ital. rajgræs samt mod væselhale anbefales det også at tilsætte Atlantis OD som anført i skemaet.

Nedenstående tabel viser en oversigt over vores anbefalinger mod ukrudt i vintersæd om foråret.

Anbefalinger i vintersæd mod græs- og tokimbladet ukrudt om foråret					
Middel og dosering pr. ha		Vinterhvede og triticale	Rug	Vinterbyg	Kommentar
Rexade 440 + PG26N	30-40 g + 0,5 l	X	X		Basisløsning i efterårsbehandlede marker. Bredbladet ukrudt og vindaks.
Rexade 440 + PG26N	50 g + 0,5 l	X	X		+ flyvehavre, rajgræs, blød hejre, alm. rapgræs og kornblomst.
Rexade 440 + Atlantis OD + PG26N	50 g + 0,3-0,4 l + 0,5 l	X			+ enårig rapgræs, agerrævehale samt ital. rajgræs.  Mod store bestande af væselhale kan Atlantis OD hæves til 0,5-0,6 l/ha.  <b>I ikke efterårsbehandlede marker.</b>
Broadway + PG26N  Rexade 440 + PG26N	110 g + 0,5 l  25 g + 0,5 l	X	X		Gold Hejre  Broadway ved vækststart og følg op med Rexade 440 10-14 dage senere.
Zypar	0,5-1,0 l	X	X	X	Opfølgende ukrudtsbekæmpelse mod bredbladet ukrudt.

## Cossack OD i marts.

Det er også muligt at bruge Cossack OD. Følg Cossackvejret på Bayers hjemmeside:  
<https://www.cropscience.bayer.dk/bayer-nordic-field-tools/timing-tools/cossack-vejret>

## Anbefalinger til bekæmpelse af ukrudt i vintersæd med Cossack OD

	Hvede + Triticale	Rug	Vinterbyg
Enårig rapgræs + Tokimbladet ukrudt	0,5-0,6 l Cossack + 0,5l olie	0,5-0,6 l Cossack + 0,5l olie	0,05l Hussar Plus OD + 0,5 olie
+ Alm. Rajgræs	0,5-0,7l Cossack + 0,5l olie + 5kgN*	0,6l Cossack + 0,5l olie	0,05l Hussar Plus OD + 0,5 olie
+ Væselhale, Rævehale eller Ital. Rajgræs	0,8-0,93l Cossack + 0,5 olie + 5kgN*	0,6l Cossack + 0,5l olie	Ikke mulig
Rævehale eller Væselhale	0,8-0,9l Atlantis + 0,5l olie + 5kgN*		

\*N udbringes via en flydende gødning, vælg en svovlfattig gødning fx Dan NS 27-3 eller N18 OBS! Alternativt kan anvendes 2 l/ha svovlsur ammoniak (Teamup/Kvikup) i stedet for flydende gødning. Der må IKKE iblandes N, ved behandling af rug eller vinterbyg!

## Sprøjteteknik.

Ved bekæmpelse af græsukrudt er det vigtigt at anvende korrekt sprøjteteknik. Brug små dråber, og sprøjt ikke på regn- og dugvåde planter.

Anvend lilla 025 eller blå 03 lowdriftsdyse. Afdriftsreducerende dyser f.eks. IDKT03 blå vinklet dyse kan også bruges, men tryk skal øges til 4,1 bar ved 200 l vand/ha og 8 km/t for at få en god og fin dækning af græsukrudtet. Det optimale sprøjtetidspunkt er bedst mellem kl. 10 og 15 på tørre planter ved kørsel de første par uger i marts måned.

## Ukrudtsbekæmpelse på veje, gårdspladser mv.

Det er IKKE længere tilladt at anvende Glyphosat/Roundup !

**TopGun** Finalsan skal blandes op med vand i forholdet 1000 liter/ha = 10 liter/100 m<sup>2</sup> (opblan- det sprøjtevæske). 16 % = 1,6 liter produkt + 8,4 liter vand = 10 liter opblandet sprøjtevæske. 20 liter opblandet med vand rækker til 1250 m<sup>2</sup>

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle

