

Afgrødenyt nr. 3

21. marts 2025

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Ukrudt i vinterraps
- Bor til raps
- Vækstregulering af vintersæd

Ukrudt i vinterraps (Markbogen side 54)

I vinterraps bør ukrudt bekæmpes om efteråret med op til 0,5 liter Belkar, evt. i splitbehandling.

Det er stadig muligt at anvende Matrigrøn SG, men kun til stadie 50, hvor knopperne bliver synlige. Temperaturkrav på over 15 grader gør, at dette ikke længere er muligt.

Det er muligt at anvende **0,65 liter Korvetto/Ha**. Der er god effekt mod: agertidse, burresnerre, kornblomst, lægejordrøg, mark-valmue, og tvetand. Lidt ringere effekt på: alm. brandbæger, hvidmelet gåsefod, kornvalmue, **lugtløs kamille**, **vellugtende kamille** og storkenæb. Korvetto indeholder 120 g/l clopyralid og 4,8 g/l Arylex Active.

Korvetto virker ved at begge aktivstoffer optages i ukrudtets blade. Den bedste effekt opnås ved behandling på småt ukrudt i en veletableret afgrøde. Anvend Korvetto, når dagstemperaturen er 10°C og der ikke er udsigt til frost.


Så snart knopperne er synlige i raps, er behandling med Matrigrøn SG og korvetto ikke længere mulig!

Bor til Raps (Markbogen side 213)

Behovet for tilførsel af Bor er størst på JB 4 og derunder, samt på arealer med højt reaktionstal.

Det anbefales at tilføre 2-4 liter Bor pr. hektar pr.

vækstsæson.



Vækstregulering af vintersæd (Markbogen side 21-24)

Vinterhvede.

I blødstråede- og tidligt såede sorter, bør vækstreguleringen tildeles ad 2 omgange.

Vinterbyg.

I velgødede marker med hybridsorter, bør der vælges en todelt strategi, mens der i 2-radet sorter kan være nok med en enkelt behandling. Moddus M bør anvendes efter stadie 33 i stedet for Moddus start. Behandling med Cerone før skridning bør prioriteres. Dosis efter vækstforhold.

Vinterrug.

Samme strategi som i hvede. Dog kan der forventes højere effekt, og dosis bør justeres. Moddus M bør anvendes efter stadie 33 i stedet for Moddus start.

Blanding med græsmidler.

Stabilan Extra kan normalt blandes med græsmidlerne. (læs etiketten). Ellers kan behandling udsættes til senere, med Trinexapac-produkter i blanding med svampemidler eller bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt.

Oversigt over midler, aktivstof, og temperaturkrav.

Middel	Aktivstof					God effekt fra ca. °C
	Chlormequat chlorid (CCC)	Mepiquat chlorid	Prohexadion- calcium	Trinexapacethyl	Ethephon	
Cycocel 750	x					8
Trece 750	x					8
Stabilan Extra	x					8
Moddus Start				x		8
Cuadro NT				x		8
Trimaxx M				x		8
Moddus M				x		8
Sonis				x		8
Moddevo				x		8
Medax Max			x	x		8
Medax Top		x	x			8
Cerone					x	12
Terpal		x			x	12

Tabel 1. Anbefalede vækstreguleringsstrategier i de forskellige vintersædsarter.

Strategi	Middel og dosis, ltr./ha*	Bemærkninger**
Vinterhvede:		
Opstart / enkeltbehandling	0,5 l/ha Stabilan Extra (+ 0,15 l/ha Moddus Start / 0,2 l Moddus M. hvis ingen samtidig græsbekæmpelse) <i>eller</i> 0,3 l/ha Moddus Start / 0,4 l/ha Moddus M.	St. 30-31
		St. 31-33
Opfølgning i kraftige marker / blødsråede sorter og/eller ved frodige vækstforhold	0,2 l/ha Moddus M. + 0,2 l/ha Cerone (maks. i alt 0,4 l/ha Moddus M. pr. sæson) <i>eller</i> 0,5-0,75 l/ha Medax Top + 1,0 l/ha Ammoniumsulfat	Senest st. 37-39
Vinterbyg:		
Splitbehandling (især aktuell i 6-radede sorter, herunder hybrider og/eller i meget kraftige marker / blødsråede sorter)	<i>Første split:</i> 0,2-0,3 l/ha Moddus Start / 0,3-0,4 l/ha Moddus M.	St. 30-31
	<i>Anden split:</i> 0,2 l/ha Cerone + 0,2 l/ha Moddus M. <i>eller</i> 0,2-0,3 l/ha Cerone (kun forebyggelse aksnedknækning)	St. 37-39
		St. 39-49
Enkeltbehandling	0,2-0,3 l/ha Moddus Start / 0,3-0,4 l/ha Moddus M. <i>eller</i> 0,2-0,3 l/ha Cerone (kun forebyggelse aksnedknækning)	St. 31-32
		St. 39-49
Vinterrug***:		
Opstart / enkeltbehandling	0,5 l/ha Stabilan Extra (+ 0,15-0,2 l/ha Moddus Start / 0,2-0,25 l/ha Moddus M. hvis ingen samtidig græsbekæmpelse) <i>eller</i> 0,3-0,4 l/ha Moddus M. / 0,2-0,3 l/ha Moddus Start	St. 30-31
		St. 31-32
Opfølgning i kraftige marker / blødsråede sorter og/eller ved frodige vækstforhold	0,2 l/ha Moddus M. + 0,2 l/ha Cerone (Cerone er hård ved rugen, hvis der ikke er optimale forhold)	Senest st. 37-39***

*Obs. på maks. dosis i alt i for trinexapac-produkter. **St. 30 = Begyndende strækning af hovedskud. St. 31 = 1. knæ kan mærkes ca. 1 cm over vækstpunktet. ***Moddus M. må anvendes indtil st. 39 i vinterrug, mens Moddus Start ikke må anvendes efter st. 33 i vinterrug.

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle.