

Afgrødenyt nr. 8

Denne meddelelse indeholder følgende emner.

30. maj 2025

- Svampebekæmpelse i vårbyg
- Svampebekæmpelse i havre
- Svampebekæmpelse i vinterhvede

Svampebekæmpelse i vårbyg (Markbogen side 34)

Vi har nu fået vand, og noget lavere temperaturer. Vårbyggen står de fleste steder nogenlunde, selvom vi stadig har behov for mere nedbør for at nå i mål. De først såede marker er tæt på skridning (st.49), mens de sidst såede er fra st. 30, og opefter.

Byg i strækningsfasen, kan svampehandles med **Prosaro : 0,25 liter/ha**. I kraftige, og velgødede marker, kan det være aktuelt at vækstregulere med **Moddus M: 0,25 liter /ha**. Der kan evt. tilsættes flydende mangan: 1 liter/ha.

Omkring skridning kan svampebehandlingen afsluttes med **Propulse: 0,3 liter/ha. +Pictor Aktive: 0,2 liter/ha. + SP 50: 0,2 liter/ha**. Comet Pro: 0,25 liter/ha. Kan også erstatte Pictor Aktive og spredet klæbemiddel. For at undgå aks- og strånedknækning kan der tilsættes **Cerone: 0,15 liter/ha**. Undgå behandling ved temperaturer over 25 grader, samt på tørkestressede planter. Tjek for kornbladbillens larve og lus inden afsluttende behandling. Skadetærskelen for kornbladbillens larve er 0,5 larve/strå, og for lus er det 25% angrebne strå. Ved behov kan der anvendes: **Lamdex 0,1 kg/ha. + Pirimor 500 WG: 0,07 kg/ha**. for bedre effekt i tæt afgrøde. Bladlus i vårbyg og havre sidder i bunden af afgrøden ved stråbasis over jordoverfladen, og kan være lidt svære at bekæmpe.

Svampebekæmpelse i havre (Markbogen side 36)

I havre kan svampebehandlingen bestå af 1 enkelt behandling med **Prosaro: 0,3 liter/ha. + Comet Pro: 0,15 liter/ha**. I kraftige marker kan der vækstreguleres med **Moddus M: 0,2 liter/ha**. senest i st. 34! (Må ikke bruges i grynhavre!) Skadedyr: Som i vårbyg herover.



Bladlus i vårbyg

Planteværn i vårbyg.

Vækstregulering (obs. på trinexapacregien)			
St. 30-32 (forebyggelse af lejesæd og strånedknækning)	Moddus Start	0,3 ltr.	Anvendes i en periode med min. 8-10°C uden nattefrost og med fortsat lunt vejr i vejrudsigten. Hold min. 7 dages interval til ukrudtsbehandling.
St. 33-39 (forebyggelse af strå- og aksnedknækning)	Moddus M. + Cerone	0,25 ltr. + 0,15-0,2 ltr.	Bør kun udføres i en afgrøde i god vækst og uden tørkestress. Undlad Cerone i meget varmt vejr over 25°C.
	eller Moddus Start + Cerone	0,2 ltr. + 0,15-0,2 ltr.	
St. 45-49 (forebyggelse af aksnedknækning)	Cerone	0,2-0,3 ltr.	Bør kun udføres i en afgrøde i god vækst og uden tørkestress. Undlad Cerone i meget varmt vejr over 25°C.
Svampe			
St. 31-32 Meldug, skoldplet, bladplet, bygrust	Prosaro	0,25 ltr.	Vær især obs. på skoldplet ved forfrugt byg eller rug og på lejefri dyrkning.
St. 39-45 Skoldplet, bladplet, bygrust	Propulse SE 250 + Pictor Active + Spredeklæbemiddel	0,25-0,35 ltr. + 0,2 ltr. + 0,2 ltr.	Anvend højst angivne dosis hvis behov for/ønske om forebyggelse af ramularia.
	eller Propulse SE 250 + Comet Pro	0,3-0,4 ltr. + 0,2 ltr.	
Skadedyr			
Bladlus	Mavrik	0,07-0,1 ltr.	Ved 25-40% angrebne strå. Laveste tærskel ved evt. samtidig behov for svampebehandling. Pirimor 500 WG har dampvirkning og anbefales i tætte afgrøder. 0,05 ltr./kg/ha Mavrik/Kalso Sorbie + 0,05 kg/ha Pirimor 500 WG kan alternativt anvendes mod bladlus.
	eller Pirimor 500 WG	0,07-0,1 kg	
Bladlus, kornbladbillens larver, byghuer	Lamdex (Mindre anvendelse mod byghuer)	0,2 kg	Behandling foretages ved 0,5-1 kornbladbillelarve pr. strå og/eller 25-40% angrebne strå af bladlus. Tjek for angreb af byghuer især i sentsæde marker og/eller på lokaliteter med erfaring for angreb af byghuer. Maks. 3 beh. med Lamdex pr. år. Godkendt til mindre anvendelse mod byghuer.

Planteværn i havre.

Svampe			
St. 33-35 Meldug, havrebladplet	Prosaro + Comet Pro	0,3 ltr. + 0,15 ltr.	Ved begyndende angreb. Specielt i grynhavre kan der være behov for svampebekæmpelse, og Comet Pro medvirker til gylden kvalitet.
Vækstregulering			
St. 30-31 Husk ingen vækstregulering i grynhavre	Moddus Start	0,3-0,4 ltr.	Maks dosis Moddus Start er 0,4 ltr./ha, alternativt splitbehandling med 2x0,2 ltr./ha.
Skadedyr			
Skadedyr som i vårbyg uden udlæg.			
Mikronæring			
Forebyggelse af mangan-mangel	Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	1,5 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende og efter behov ved nytivækst. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis blanding med andre midler.
Mangan, kobber og zink	MikroCare Universal	0,5-0,75 kg	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO MicroTop + Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis blanding med andre midler.

Svampebehandling i vinterhvede. (Markbogen side 20)

Når vinterhveden er gennemskredet, kan den aksbeskyttes på flere måder, af hensyn til triazolreglerne.

- Hvis der er brugt Prosaro ved T1-behandlingen, kan der **ved T3** kun bruges **Propulse: 0,3-0,4 liter/ha. + Comet Pro: 0,2-0,3 liter/ha.** Pictor Aktive: 0,2 liter/ha. kan erstatte Comet Pro. Husk-altid spredklæbemiddel når der bruges Pictor Aktive. (0,2 liter/ha.)
- Hvis der er brugt Proline ved T1-behandlingen, kan der **ved T3** også bruges **Greteg Star: 0,2 liter/ha.** sammen med Propulse.

Skadedyr:

Undersøg om der er lus i aksene inden hveden færdigbehandles. Skadetærsklen for lus er 25% angrebne strå. Se forslag til behandling herunder.

Planteværn i hvede.

Svampe (obs. på triazolreglerne)			
St. 31-33 (T1) Septoria, gulrust og meldug	Proline EC 250 + evt. Comet Pro	0,25 ltr. + 0,15 ltr.	T1 anvendes hvis gulrust og/eller risiko for septoria. Der tilsættes 0,1 ltr./ha Talus hvis samtidig meget meldug.
St. 39 (T2) Septoria, gulrust og moderat hvedebladplet (DTR) og meldug	1. aksbeskyttelse Balaya 200 EW	0,6-0,8 ltr.	Balaya må anvendes 1 gang pr. sæson og senest i st. 40. Anvend højeste dosis Balaya ved højt smittetryk af septoria. Hvis meget hvedebladplet (DTR) anvendes istedet en blanding af Propulse + Balaya.
St. 53-61 (T3) Septoria, gulrust og brunrust	2. aksbeskyttelse Propulse SE 250 + Orius Gold/Greteg Star	0,3-0,4 ltr. + 0,2 ltr.	Orius Gold foretrækkes som blandingspartner til Propulse hvis meget gul- og/eller brunrust. Obs. på triazolregnskabet i forhold til middelvalg og dosis i den samlede svampestrategi i hvede.
Skadedyr			
Bladlus, hvede- og sadelgalmyg	Lamdex eller Mavrik	0,15-0,2 kg 0,08-0,2 ltr.	Højeste dosis mod hvede- og sadelgalmyg. Maks. 3 behandlinger pr. år med Lamdex. Maks. 2 behandlinger om foråret med Mavrik. 0,1 kg/ha Pirimor 500 WG eller 0,05 ltr./kg/ha Mavrik/ Kaiso Sorbie + 0,05 kg/ha Pirimor 500 WG kan alternativt anvendes mod bladlus med maks 1 beh. pr. år.



Bladlus i hvedeaks.

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle.