

Afgrødenyt nr. 11

Denne meddelelse indeholder følgende emner.

1. august 2025

- Flotte udbytter i Landsforsøg 2025
- Etablering af Vinterraps
- Bekæmpelse af ukrudt og spildkorn i vinterraps
- Skadedyr, mikronæring og vækstregulering i Vinterraps

Vinterraps 2025-26

De nyeste forsøg fra 2025 viser igen, at det sortiment vi har er i absolut top.

Højestydende med særdeles god sundhed, og frø der kommer med ind i laden og ikke drysler på jorden! **Følgende sorter tilbydes:**

420241	Turing	Stabil højtydende sort - sund
420242	Golding (UDSOLGT)	Ny højtydende sort - sund
420244	Andor	Højtydende sort – tidlig etablering - sund
420220	LG Armada	Stabil LG-sort
420246	Cumulus-hvid Flower Power	sammen m/Golding – undgå skadedyrsmidler.
421085	Credo	Kålbroktolerant højtydende – sund
420252	Crown	Kålbroktolerant højtydende - sund

Vinterbyg 2025-26

405814	Orchade 2r (havrerødsot tolerant)	Meget sund sort, langt strå, høj stråstyrke
405840	NOS Contador 2r	Stråstiv sort med meget lidt bladplet
405400	NOS Valverde 2r	Topudbytte - sund sort – høj stråstyrke
400809	SY Dakoota 10 unit (hybrid 6rd)	Velkendt hybrid med højt udbytte
405430	LEANDRA vår/vinterbyg	Vårbygssort velegnet til såning sent efterår

Etablering af vinterraps.

- Sædskifte

For at undgå problemer med kålbrok, skal der helst være 5 frie år mellem rapsafgrøderne. Gerne 3 frie år mellem raps og ært/hestebønner. Det er også muligt at vælge en kålbroktolerant sort, hvis en mark ikke opfylder disse krav.

Reaktionstallet bør ligge mellem 6,0-6,9, alt efter jordtype. Der kan tildeles ca. 2 tons jordbrugskalk/hektar, inden etablering af raps, hvilket mindsker risiko for angreb af kålbrok, og i visse tilfælde reducerer risiko for snegleangreb.

Der er planlagt en afgift på jordbrugskalk fra år 2027

- Såning

Der bør etableres max. 30 planter/m². i et godt løsnet såbed og sås i 2 cm dybde. Hvis marken pløjes, bør man udsætte såning, ved udsigt til kraftig nedbør lige efter såning.

**Udsædsmængde af vinterraps i kg. pr. ha.
90% markspiring:**

Kg/ha TKV	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Frø/kvm							
30	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5
35	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9
40	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3
45	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8

**Hybridraps, ha pr unit
90% markspiring:**

ha/unit	0,5 mill frø/unit	1,0 mill frø/unit	1,5 mill frø/unit
Frø/kvm			
30	1,50	3,00	4,50
35	1,29	2,57	3,85
40	1,13	2,25	3,38
45	1,00	2,00	3,00

TKV (tusindkornsvægt) står normalt på sækken

Bekæmpelse af snegle:


Der tildeles 5 – 7 kg Ironmax Pro pr. ha. ved såning, og suppleres efter behov.

- Gødsning

I efteråret kan der tildeles op til 60 kg kvælstof/ha. evt. i husdyrgødning. Der kan også anvendes fast eller flydende handelsgødning.



Rapshøsten på Mors er i fuld gang..




Bekæmpelse af ukrudt og spildkorn i vinterraps. (Markbogen side 56)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt			
Enårig rapræs, hyrde- taske, burresnerre, tve- tand, fuglegræs, ærenpris	Kalif 360 CS	0,2-0,25 ltr.	Maks. 0,25 ltr./ha. Udsprøjtes lige efter såning og senest inden fremspiring. På JB 1-2 maks. 0,2 ltr./ha. Højeste dosering mod enårig rapræs og burresnerre. Samtidig opnås en vis hæmmende effekt mod væselhale.
Kamille, storkenæb, læ- gejordreg, kornblomster, valmue, burresnerre, hyrdetaske, tvetand, hankro og fuglegræs. Samtidig hæmning af stedmoder og ærenpris.	Ensartet afgrøde i god vækst - enkeltbehandling fra 6 løvblade: Belkar	0,5 ltr.	Højeste dosis tidligst når rapsen har 6 løvblade og er i god vækst.
	Uensartet afgrøde med langsom vækst - splitbe- handling fra 3 løvblade:		
	Ved 3 løvblade: Belkar	0,25 ltr.	Hvis mange storkenæb og/eller stort ukrudtstryk og/eller uens plantestørrelse og langsom vækst foretrækkes splitbehandling. Lunt vejr fremmer effekten. Belkar kan kun blandes med skadedyrsmidler hhv. lavkoncentrerede mikronæringsstofblandinger.
	Opfølgning 2-3 uger senere: Belkar	0,25 ltr.	OBS: 7 dages interval til andre behandlinger.
Spildkorn	Agil 100 EC	0,35-0,5 ltr.	Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg og højeste mod rug. Anvendes mindre end 0,3 ltr./ha Agil og/eller ønsker man en hurtigere effekt, kan det være en fordel at tilsætte olie/spredekæbemiddel til behandlingen.
	eller		Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod spildfrø af rajgræs. Laveste dosis mod spildkorn af vårbyg og højeste dosis mod græsser, og hvis der ikke forventes anvendt Kerb efterfølgende. Både Agil 100 EC og Focus Ultra må anvendes i split med henholdsvis maks. i alt 0,74 ltr./ha for Agil 100 EC og 2,0 ltr./ha for Focus Ultra. Splitbehandling med Agil 100 EC er kun tilladt i efteråret, mens Focus Ultra må anvendes i split i efteråret eller med én gang om efteråret og én gang om foråret.
Spildkorn, gold og blød hejre samt spildfrø af rajgræs	Focus Ultra + Dash	0,75-1,5 ltr. + 0,5 ltr.	
Vanskelige græsukruds- arter som især rajgræs, væselhale, hejre og agerrævehale samt fug- legræs/forebyggelse af resistens i sædskiftet.	Kerb 400 SC	1,25 ltr.	Må kun anvendes i november og december måned. Bedst effekt på græsser - herunder især væselhale - opnås ved så tidlig kørsel som muligt, når jordtemperaturen er under 10°C.

Skadedyr, mikronæring og vækstregulering i Vinterraps. (Markbogen side 57.)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Vækstregulering			
Vækstregulering	Caryx	0,5-0,7 ltr.	Bedste vækstregulerende effekt opnås ved behandling på rapsens 5. løvbladstadiet. Højeste dosis anvendes i tidligt såede og/eller kraftige marker. Caryx har sideeffekt på rodhalsråd (phoma).
Skadedyr			
Rapsjordlopper	Lamdex	0,2 kg	Behandling foretages hvis der er små huller i bladpladerne på flertallet af planterne frem til rapsen har udviklet mindst 3 løvblade.
	Mavrik	0,15 ltr.	Maks. 1 behandling med Mavrik om efteråret.
Agersnegle	Ironmax Pro eller SluXX HP	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende ved såning - især ved ud-sider, på knoldede lerede områder i marken og/eller ved direkte såning. Gentagne opfølgende behandlinger kan være nødvendig. Se produktside.
Rapsjordloppernes larve	Kaiso Sorbie	0,1-0,12 kg	Forebyggende behandling bør foretages i løbet af oktober måned, og inden frost i flere nætter i træk.
Mikronæring			
Bormangel	Bor 150 MEA	1-2 ltr.	Størst risiko ved tørre forhold på lettere jorde og/eller ved højt Rt. Anvendes fra rapsen har udviklet 4 løvblade. Tilsæt pH-Easy ved tankblandinger med bor.
Magnesium, bor, mangan og molybdæn	MikroCare Universal	0,5-0,75 kg	Anvendes forebyggende fra rapsens har udviklet 4 løvblade.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO Microtop + Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende fra rapsen har udviklet 4 løvblade. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
	Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	1,5-2,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende fra rapsen har udviklet 3-4 løvblade. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.

Vær opmærksom på tidlige angreb af rapsjordlopper, da bejdsningen af frøene kun har begrænset effekt. Rapsjordlopper bekæmpes ved max. 5 % bortgnavet bladareal



Angreb af rapsjordlopper

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle

