

Afgrødenyt nr. 13

Denne meddelelse indeholder følgende emner.

12. september 2025

- Ukrudt i vinterbyg
- Ukrudt i vinterrug
- Ukrudt i vinterhvede og triticale
- Info omkring brug af Boxer
- Brug af Mateno Duo timeren

Ukrudt i vinterbyg (Markbogen side 31)

I vinterbyg bør der vælges mellem behandling med Legacy eller Mateno Duo. Hvis der bruges Legacy, bliver der muligvis behov for Trimmer til bekæmpelse af spildraps.

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt			
Enårig rapgræs, vindaks, rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Anvend højeste dosis Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs og agerrævehale. Anvendes 7 g/ha Trimmer SG som opfølgning mod tokimbladet ukrudt, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Trimmer SG og Nicanor SG til foråret.
	Opfølgning st. 11-12: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC + evt. Trimmer SG	1,0-2,0 ltr. + 7 g	
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs, meget spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 9-10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterbyg og vinterrug skal Mateno Duo og Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 ltr./ha i disse afgrøder. Rette timing af behandlingen er vigtig. Anvend højeste dosis Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC	1,0-2,0 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Anvend højeste dosis Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredeklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	Anvendes 7 g/ha Trimmer SG som opfølgning mod tokimbladet ukrudt kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Trimmer SG og Nicanor SG til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller lusemiddel efter behov i den opfølgende behandling.
Skadedyr			
Bladlus	Kaiso Sorbie	0,07-0,1 kg	Ved fund eller varsel. Maks. 1 behandling om efteråret med Mavrik og maks. 1 behandling pr. vækstår med Kaiso Sorbie.
	Mavrik	0,07-0,1 ltr.	

Boxer og Mateno Duo må ikke blandes i vinterbyg! Max dosis af Mateno Duo i vinterbyg er 0,35 liter /ha. Bemærk krav til Boxer vedr. temperatur, samt krav til afdriftsreduktion.

Ukrudt i vinterrug (Markbogen side 27)

Hvis Mateno Duo vælges, skal den også køres ud separat, inden opfølgning med Boxer.

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 29-30			
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Opfølgning med Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC på kornets st. 11. Boxer 800 EC-/Boxer-/Roxy EC-dosis øges hvis udfordringer med besværlige græsarter som agerrævehale m.v. Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler til foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC + evt. Trimmer SG	1,0-1,5 ltr. + 7 g	
Enårig rapgræs, vindaks, spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt lidt rajgræs, agerrævehale og væselhale	St. 10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterrug og vinterbyg skal Mateno Duo og Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 l/ha i vinterrug og vinterbyg. Rette timing af behandlingen er vigtig. Højeste dosis Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC ved meget rajgræs og agerrævehale. Er der væselhale anbefales yderligere opfølgning med maks. 0,45 ltr./ha Atlantis OD i st. 12-13. Atlantis OD kan være hård ved rugen.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC	1,0-2,0 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05 ltr.	Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps i efteråret, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Cossack OD til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller lusemiddel til Trimmer SG.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredelæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	
Rajgræs, agerrævehale, spildkorn af havre/vårbyg, enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,5-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Mindst 2,0 ltr./ha Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC for at forebygge resistens mod agerrævehale.
	Opfølgning st. 12-13: Topik + Renol	0,2 ltr. + 0,5 ltr.	Opfølgning i efteråret med Topik på nyfremspiret græsukrudt/spildkorn af vårbyg/havre.

Ukrudt i vinterhvede og tritcale (Markbogen side25)

I hvede og tritcale kan man godt blande Boxer og Mateno Duo. Behandling med både Legacy og Mateno Duo kan give afgrødeskader, og bør undgås.

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 29-30			
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvætand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Anvendes Trimmer SG mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Boxer/ Roxy EC + evt. Trimmer SG + Spredklæbemiddel	1,0-1,5 ltr. + 7 g + 0,15 ltr.	Se iverigt løsning med Mateno Duo nedenfor.
Vindaks, enårig rapgræs, lidt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvætand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer 800 EC/Boxer/ Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr.	Anvendes Trimmer SG som opfølgning mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Trimmer SG + Spredklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	Der kan tilføres mangan og evt. middel mod blad- lus i st. 13 sammen med Trimmer SG efter behov.
Enårig rapgræs, vindaks, lidt rajgræs, spildraps, storke-/ hejrenæb, kornblomster, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller samt alm. tokimbla- det ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer 800 EC/Boxer/ Roxy EC	0,35-0,5 ltr. + 0,75-1,0 ltr.	Højeste angivne dosis Mateno Duo hvis korn- blomster. OBS. Maks. 0,35 ltr./ha Mateno Duo i vinterrug og vinterbyg. Mateno Duo må ikke blandes med Boxer 800 EC/Boxer/Roxy EC i vinterrug og vinterbyg.
Alm.rajgræs (stor bestand), ital. rajgræs, væselhale, agerrævehale, vindaks, en- årig rapgræs, spildraps, storke-/hejrenæb, kornblom- ster, resistent fuglegræs, valmuer og kamiller samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer 800 EC/Boxer/ Roxy EC	0,5-0,7 ltr. + 1,0-1,5 ltr.	Anvend højest angivne dosis Boxer 800 EC/Boxer/ Roxy EC og Mateno Duo og følg op med Atlantis OD hvis væselhale og/eller meget rajgræs.
	Opfølgning efter behov: Atlantis OD	0,5-0,75 ltr.	Opfølgning med 0,2 ltr./ha Topik + 0,5 ltr./ha Renol er stærkere mod spildkorn af byg/havre end Atlantis OD, men har ingen effekt mod væselhale.

Vigtig info omkring brug af Boxer !

Undgå fordampning og afdrift ved brug af den rigtige sprøjteteknik.

Få **bedre virkning** og reduceret afdrift af jordmidler – især midler med prosulfocarb

For at undgå fordampning og vindafdrift, når du sprøjter med ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb, er det vigtigt at tænke på, hvilke typer af dyser du bruger, tidspunkt og vejrforhold.

Efter vi har haft fokus på reduktion af afdrift ved sprøjtning, har det inden for de seneste år næsten været muligt at undgå fund af rester i omkringliggende arealer.

Stoffet stammer fra ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd. Bruger du jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer 800EC, Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning.



Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Syngenta er medlem af CropLife Danmark.




- Brug dyser med store dråber og godkendt til 90% afdriftsreduktion.



- Maks. 3-4 m/s.
- Vindretning bort fra arealer med frugt og grøntsager.



- Døgnetts middeltemperatur skal være under 15°C.
- Der må maksimalt være 18°C midt på dagen.



- Langsamt: max. 6-8 km/t med lav bom: max. 50 cm.
- God vandmængde: 200-250 l/ha.
- Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken.



- Sprøjt aften eller nat i tidsrummet: 19.00-05.00.



- Jordoverfladen skal helst være fugtig.



- Vejrudsigten skal helst byde på kølige forhold, gerne overskyet, evt. let regn.
- Ved kraftig nedbør eller tørt, varmt og blæsende vejr skal man ikke sprøjte.



- Hvis du har marker i nærheden af frugt- eller grøntsagsproducenter: Overvej, om du kan vente med at sprøjte til efter frugt og grøntsager er høstet.
- Tal med naboerne om det bedste sprøjtetidspunkt.


Dyseforslag ved brug af Boxer

Dyse 03		km/t	min. bar	l/ha
Agrotop	TurboDrop Hispeed 110-03	5,8	2	200
Hardi	Minidrift DUO 110-03	5,1	1,5	200
Lechler	IDKT 120-03	5,1	1,5	200
Lechler	ID-120-03 keramisk	6,6	2,5	200
Lechler	ID-120-03 POM	7,1	3	200
TeeJet	TeeJet TTI60-110 03 VP-C	5,1	1,5	200
Dyse 04				
Agrotop	TurboDrop Hispeed 110-04	7,7	2	200
John Deere	PSULDQ2004A	7,5	2,5	200
Lechler	ID-120-04 keramisk	7,5	2,5	200
Lechler	ID-120-04 POM	8*	2,8	200
TeeJet	TTI 110 04 VP	7,7	2	200
TeeJet	TeeJet TTI60-110 04 VP-C	8*	2,8	200
Dyse 05				
Billericay	Air Bubble Jet 05	6,9	1	200
Hardi	Nanodrift	6,9	1	200
Hardi	Minidrift Duo	6,9	1	200
Lechler	IDKT 120-05 POM	6,9	1	200
TeeJet	AIXR 110 05 VP	8**	1,5	200

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Tel. +45 32 87 11 00
www.syngenta.dk

Brug af Mateno Duo timeren

Prøv Mateno Duo-timeren på Bayers hjemmeside. <https://www.cropscience.bayer.dk/bayer-nordic-field-tools/timing-tools/mateno-timeren?postalcode=7900>



Lige nu er optimal brug af Mateno Duo 8-12 dage efter såning.

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle