

Afgrødenyt nr. 14

Denne meddelelse indeholder følgende emner.

1. oktober 2025

- Bladlus i vintersæd
- Vækstregulering, skadedyr og mikronæring i vinterraps.
- Brug af Vixeran kan nås endnu.

Bladlus i vintersæd (Markbogen side 26)

Risikoen for angreb af bladlus, som smitter med havrerødsot opstår som regel 3 uger efter såning-afhængig af vejret. Supplerende behandling kan udføres ca. 4 uger senere.

Brug evt. Syngentas App: **Syngenta Portal**, som hentes til telefonen i Google Play eller AppStore.

Behandling: **0,15 kg Lamdex/hektar må bruges i stadie 9-12**, ellers bruges Kaiso Sorbie eller Mavrik. Se herunder. Der kan blandes med Mangannitrat, Mikrocare Universal eller Microtop.

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Skadedyr			
Bladlus	Kaiso Sorbie	0,07-0,1 kg	Ved fund eller varsel. Maks. 1 behandling med Mavrik om efteråret, og maks. 1 behandling med Kaiso Sorbie pr. vækstår.
	Mavrik	0,07-0,1 ltr.	
Snegle	Ironmax Pro eller SluXX HP	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende - især ved markskel og på knoldede, lerede områder i markerne. Gentagne behandlinger kan være nødvendig. Se produktsider for vejledning.
Bygfluer og aksløberlarver	Lamdex (Mindre anvendelse)	0,2 kg/ha	Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse ved brug af Lamdex mod bygfluer og aksløberlarver i vintersæd. Kan anvendes i september-oktober i kornets st. 11-12. Vær især opmærksom på lokaliteter, hvor der i foregående år har været større angreb. Lamdex vil samtidig have effekt mod tidlige angreb af bladlus.
Mikronæring			
Forebyggelse af mangan-mangel	Mangannitrat 235 + spredklæbemiddel	1,5 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende og efter behov ved nyttilvækst. Spredklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
Mangan, kobber og zink	MikroCare Universal	0,5-0,75 kg	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO MicroTop + Mangannitrat 235 + Spredklæbemiddel	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende eller efter planteanalyse. 1,0-1,5 kg/ha EPSO Mikrotop kan med fordel tilsættes flere gange i sæsonen. Spredklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.


Bladlus i Vintersæd

Vækstregulering, skadedyr og mikronæring i vinterraps.(Markbogen side 57)

Se Afgrødenyt nr. 11, vedrørende ukrudt.

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Vækstregulering			
Vækstregulering	Caryx	0,5-0,7 ltr.	Bedste vækstregulerende effekt opnås ved behandling på rapsens 5. løvbladstadiet. Højeste dosis anvendes i tidligt såede og/eller kraftige marker. Caryx har sideeffekt på rodhalsråd (phoma).
Skadedyr			
Rapsjordlopper	Lamdex	0,2 kg	Behandling foretages hvis der er små huller i bladpladerne på flertallet af planterne frem til rapsen har udviklet mindst 3 løvblade.
	eller Mavrik	0,15 ltr.	
Agersnegle	Ironmax Pro eller SluXX HP	5,0-7,0 kg	Anvendes forebyggende ved såning - især ved ud-sider, på knoldede lerede områder i marken og/eller ved direkte såning. Gentagne opfølgende behandlinger kan være nødvendig. Se produktside.
Rapsjordloppernes larve	Kaiso Sorbie	0,1-0,12 kg	Forebyggende behandling bør foretages i løbet af oktober måned, og inden frost i flere nætter i træk.
Mikronæring			
Bormangel	Bor 150 MEA	1-2 ltr.	Størst risiko ved tørre forhold på lettere jorde og/eller ved højt Rt. Anvendes fra rapsen har udviklet 4 løvblade. Tilsæt pH-Easy ved tankblandinger med bor.
Magnesium, bor, mangan og molybdæn	MikroCare Universal	0,5-0,75 kg	Anvendes forebyggende fra rapsens har udviklet 4 løvblade.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO Microtop + Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende fra rapsen har udviklet 4 løvblade. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.
Mangan	Mangannitrat 235 + Spredeklæbemiddel	1,5-2,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende fra rapsen har udviklet 3-4 løvblade. Spredeklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.

Vixeran til Vinterraps



Kvælstoffikserende bakterier har igen i år givet merudbytte i forsøg på 350 kg/ha.

Vi anbefaler at bruge **50 gram Vixeran pr Hektar i rapsens 2-6 bladsstadie**. Kan blandes med de fleste midler. (Dog ikke Focus Ultra !) Læs mere i Afgrødenyt nr. 12.

Med Venlig Hilsen Mollerup Mølle