

## Afgrødenyt nr. 3

17-03-2026

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret.
- Ukrudt og mikronæring i vinterraps.
- Ultima ProFF - Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer

### Ukrudtsbekæmpelse i foråret.

I Vintersæd er bekæmpelse af overvintrende græsukrudt mulig, så snart nattefrosten er væk, og planterne er i aktiv vækst, med temperaturer der nærmer sig 2- cifrede varme grader. Følg mulighederne og vejrudviklingen på: [Cossackvejret.dk](http://Cossackvejret.dk) Tidlig behandling, på små planter giver størst effekt. Rexade 440 og Cossack OD har generelt god effekt på græsukrudt. Er der meget græsukrudt, ital. Rajgræs eller agerrævehale, kan effekten på disse øges, ved at tilsætte 5-8 kg N/ha. i DanGødning. Brug gødninger med lavt svovlindhold, da der ellers er risiko for svidninger. DG Leaf N-18 er uden svovl, og kan derfor anbefales.

**Rexade 440** indeholder aktivstofferne fra Broadway og Zypar, og har derfor også god effekt på bredbladet ukrudt såsom storkenæb, kornblomst, tvetand, hundepersille, lægejordrøg og valmue. Rexade kan bruges i kornets st. 23 – 32. Tilsættes altid 0,5 liter PG26N pr ha.

**Cossack OD** kan anvendes i kornets stadie 23- 32, og har god effekt på normale bestande af græsukrudt, samt de fleste 2 –kimbladede ukrudtsarter. Tilsættes altid 0,5 liter Renol pr. ha.

Tilsætning af 0,3-0,4 liter **Atlantis OD** pr. ha. øger effekten på enårig rapgræs.

Husk restriktionerne på forårsanvendelse, hvis der er anvendt Atlantis eller SU-midler i efteråret!

Det er vigtigt at anvende **god sprøjteteknik**, da midlerne er bladmidler. Sprøjt ikke på dug- og regnvåde planter, men kør op ad formiddagen med dyser, som giver god dækning. Husk, at notere vækststadiet i sprøjtejournalen.

Ved bekæmpelse **af gold- og blød hejre**, laves der en splitbehandling- først med 25 gram Rexade 440/ha., som følges op 10-14 dage senere med 110 gram Broadway/ha.

Se dosisvejledning på næste side.



Alm. Rajgræs



Italiensk Rajgræs



Gold hejre

## Ukrudt i vinterhvede og triticale om foråret (Markbogen side 29 – 30)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
<b>Ukrudt</b>			
Enårig rapgræs, alm. rapgræs, alm. rajgræs (mindre bestand), vin daks samt alm. tokimbladet ukrudt	Cossack OD* + Renol	0,5-0,6 ltr. + 0,5 ltr.	Anvendes tidligt forår ved tegn på vækst med små hvide friske rødder. Anvendes senest 1. st. 32.
Blød hejre, enårig rapgræs, alm. rapgræs, rajgræs, vindaks, agerrævehale, valmue, fuglegræs, kamille, lægejordrog, kornblomster, storkenæb samt alm. tokimbladet ukrudt	Rexade 440 + Atlantis OD* + PG26N + DG Leaf N18	37,5-50 g + 0,3-0,4 ltr. + 0,5 ltr. + 5 N	Anvendes tidligt forår ved tegn på vækst med små hvide friske rødder. Anvendes senest 1. st. 32. Maks. dosis af Rexade 440 er indtil st. 29 37,5 g/ha og 1. st. 30-32 50 g/ha. Højeste dosis mod kornblomster, græsser og flyvehavre. Atlantis OD kan undlades hvis ingen enårig rapgræs, ital. rajgræs og/eller agerrævehale. Ved anvendelse af Atlantis OD forstærkes effekten ved tilsætning af 5 kg/ha flydende N f.eks. DG-Leaf N 18. Se løvrigt side 37.
Alm. rajgræs (større bestand), ital. rajgræs, væselhale, alm. rapgræs, enårig rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt	Cossack OD* + Renol +DG Leaf N18	0,7-0,93 ltr. + 0,5 ltr. + 5 N	Anvendes tidligt forår ved tegn på vækst med små hvide friske rødder. Anvendes senest 1. st. 32. Højeste dosis samt tilsætning af 5 kg/ha flydende N (f.eks. DG-Leaf N 18) anvendes mod væselhale, ital. rajgræs og meget alm. rajgræs. Se løvrigt side 37.
Agerrævehale, flyvehavre, blød hejre, alm. rapgræs, alm. rajgræs, ital. rajgræs, vindaks, enårig rapgræs (mindre bestand), kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	Broadway + PG26N eller Atlantis OD + DG Leaf N18	180-220 g + 0,5 ltr.  0,59 ltr + 5N	Højeste dosis ved kraftige forekomster af agerrævehale. Maks. dosis af Broadway er indtil st. 29 110 g/ha, indtil st. 32 165 g/ha og indtil st. 39 220 g/ha.  Anvendes ved massiv udfordring med Agerrævehale.
Gold hejre, blød hejre, alm. rapgræs, rajgræs, vindaks, enårig rapgræs (mindre bestand), kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	Rexade 440 + PG26N Broadway + PG26N	25 g + 0,5 ltr. 110 g + 0,5 ltr.	Der opnås bedst effekt mod gold hejre ved spiltbehandling. 110 g/ha Broadway kan også anvendes i den første spiltbehandling. Opfølgende behandling 10-14 dage senere med 110 g/ha Broadway og senest 1. st. 39.
Flyvehavre, vindaks	Primera Super + Spredetælbemiddel eller Rexade 440 + PG26N eller Topik EC + Renol	0,8-1,0 ltr. + 0,2 ltr.  50 g + 0,5 ltr.  0,4 ltr. + 0,5 ltr.	Primera Super senest 1. st. 30, dog st. 39 i vinterhvede. Samtidig god effekt mod agerrævehale og hanespore.  Rexade 440 senest 1. st. 32. Samtidig god effekt mod agerrævehale og alm. rajgræs.  Topik senest 1. st. 39. Samtidig effekt mod agerrævehale, rajgræs og alm. rapgræs.
Valmue, burresnerre, fuglegræs, kamille samt alm. tokimbladet ukrudt	Primus XL + evt. Aily 20 SX*	0,4-0,5 ltr. + 7 g	Senest st. 39. Ofte en tilstrækkelig løsning som opfølgning i marker mod almindelige tokimbladede arter/hvor der har været anvendt Mateno Duo mod bl.a. storkenæb og kornblomster i efteråret.
Storkenæb, hundepersille, god forebyggelse af resistens mod fuglegræs og valmuer, burresnerre, korsblomstret ukrudt, tvetand, kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	Zypar + evt. Aily 20 SX*	0,5-0,75 ltr. + 7 g	Højeste dosis hvis stort ukrudt og/eller kornblomster.  Senest st. 45, dog senest st. 39 hvis Aily 20 SX medtages.

\* Cossack OD, Atlantis OD, Aily 20 SX og andre SU-midler må ikke anvendes i foråret, hvis Atlantis OD, Express 50 SX eller andre SU-midler har været anvendt i efteråret.

## Vinterrug.

I vinterrug kan græsukrudt bekæmpes om foråret med Rexade 440 og Cossack OD. Der kan tilsættes 0,3 - 0,4 liter Atlantis/ ha., som i hvede og triticales. **Max. 0,45 liter Atlantis/ha. i rug!** Du må max anvende 0,5 liter Cossack OD /ha. i vinterrug. Mod 2-kimbladet ukrudt kan der anvendes 0,4 – 0,5 liter Zypar/ha.

## Vinterbyg.

I Vinterbyg er eneste mulighed for bekæmpelse af græsukrudt, anvendelse af en lav dosis af Hussar Plus OD. Også her, er det vigtigt med tidlig bekæmpelse, men kræver dog temperaturer over 10 grader.

Brug max 50 ml Hussar Plus OD/ha + 0,5 liter Renol/ha. Udbringes på tørre planter, med små dråber, og god dækning. Mod 2-kimbl. ukrudt, kan Zypar, Primus XL, Mustang Forte eller Ally 20 SX anvendes.

## Vinterbyg forår. (Markbogen side 39)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
<b>Ukrudt</b>			
Vindaks og alm. tokimbladet ukrudt	Hussar Plus OD* + Renol	50 ml + 0,5 ltr.	Anvendes tidligt forår, fra st. 20, ved tegn på vækst med små hvide friske rødder og min. 8°C. <b>Senest st. 32.</b> Er marken ubehandlet i efteråret, kan der ikke forventes fuld effekt. Evt. behov for opfølgning mod nyfremspiret tokimbladet ukrudt (ikke med SU-midler). I frov/sædskifter bør Hussar Plus OD i videst muligt omfang undlades for at forebygge resistens.
Flyvehavre, hanespore	Primera Super + Spredetælbemiddel	0,8-1,0 ltr. + 0,2 ltr.	OBS. Anvendes <b>senest st. 30</b> (afsluttende buskning) for at undgå afgrødeskade.
Storkenæb, hundepersille, god forebyggelse af resistens mod valmuer og fuglegræs, kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	Zypar + evt. Ally 20 SX*	0,5-0,75 ltr. + 7 g	Senest st. 45, dog senest st. 29 hvis Ally 20 SX medtages. Højeste dosis hvis stort ukrudt og/eller kornblomster.
Alm. tokimbladet ukrudt	Primus XL + evt Ally 20 SX*	0,4-0,5 ltr. + 7 g	Senest st. 39, dog senest st. 29 hvis Ally 20 SX medtages.
Resistent fuglegræs samt alm. tokimbladet ukrudt	Pixxaro + Ally 20 SX*	0,3 ltr. + 7 g	Senest st. 45, dog senest St. 29 hvis Ally 20 SX medtages.
Kornblomster, storkenæb, god forebyggelse af resistens mod kamille samt alm. tokimbladet ukrudt	Mustang Forte + evt. Ally 20 SX*	0,5-0,75 ltr. + 7 g	Senest st. 32. OBS. på restriktioner for halmanvendelse og efterfølgende afgrøde - læs etiketten. Højeste dosis ved store kornblomster og storkenæb. Anvend 1,0 ltr/ha Mustang Forte i st. 30-32 hvis erkendt resistent kamille.
Spildkartofler, gråbynker, agertidsler, erkendt resistent kamille samt alm. tokimbladet ukrudt	Mustang Forte	1,0 ltr.	<b>St. 30-32. St. 30</b> hvis spildkartofler og <b>st. 32</b> hvis rodukudt. OBS. Restriktioner for halmanvendelse og efterfølgende afgrøde - læs etiketten. Til trods for behandlingen vil der ofte være behov for målrettet bekæmpelse for høst mod rodukudt med glyphosat (efter gældende retningslinjer).
Gråbynker, agertidsler og agerpadderokker	Metaxon + Ammoniumsulfat eller Metaxon + Ammoniumsulfat + Zypar	1,0 ltr. + 2,0 ltr.  0,75 ltr. + 2,0 ltr. + 0,5 ltr.	Anvendes i kult vej og <b>senest i st. 39.</b> Til trods for behandlingen vil der ofte være behov for målrettet bekæmpelse for høst mod rodukudt med glyphosat (efter gældende retningslinjer). Glyphosat har dog ingen effekt mod agerpadderokker.
Spildkartofler	Pixxaro EC	0,5 ltr.	Pixxaro EC har ingen restriktioner mht. efterfølgende afgrøde. Spildkartoflerne vil trods behandlingen sætte nogle døtreknolde, som bør målrettet bekæmpes med glyphosat for høst (efter gældende retningslinjer).

## Ukrudt i vinterraps.

I vinterraps bør kamille, og andre ukrudtsarter være bekæmpet i efteråret med Belkar. Hvis der stadig er problemer med kamille, kan der om foråret bruges **0,65 liter Korvetto/ha**. Behandling skal ske **senest i stadie 50**, hvor knopperne stadig er dækket, altså **ikke synlige**. For at opnå god effekt, skal der behandles på dage, hvor temperaturen er over 12 – 15 grader. Korvetto kan blandes med 1,5 liter Bor 150 MEA/ha. + 0,1 liter PH Easy/100 liter vand/ha.

## Vinterraps forår

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
<b>Ukrudt</b>			
Burresnerre, kornblomst, lægejordrøg, alm. brandbæger, valmue, tvevand, hvidmelet gåsefod, kamille og mindre storkenæb	Korvetto	0,65 ltr.	St. 30-50. Tidlig behandling ved dagtemperaturer fra 10°C. Senest når blomsterknopper stadig er omsluttet af blade. Anvend fuld dosering. Hvis der er anvendt mindst 0,4 ltr./ha Belkar i efteråret, vil der sjældent være behov for opfølgning mod kamille i foråret.
Kvik, flyvehavre samt spildkorn	Agli 100 EC	0,75-1,0 ltr.	Højeste dosering ved meget kvik samt hvor man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse. Agli 100 EC må ikke anvendes i foråret, hvis midlet har været anvendt i efteråret. Focus Ultra må anvendes i foråret, selvom det evt. har været anvendt en enkelt gang i efteråret. Dog maks. 1,0 ltr./ha pr. spilt behandling, gælder for både efterår og forår. Agli 100 EC og Focus Ultra må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.
	Focus Ultra + Dash	1,5-2,0 ltr. + 0,5 ltr.	
<b>Mikronæring</b>			
Bormangel	Bor 150 MEA	1-2 ltr.	Størst risiko ved tørre forhold på lettere jorde og/eller ved højt Rt. Tilsæt pH-Easy ved tankblandinger med bor.
Bor, mangan og molybdæn	MikroCare Universal	0,5-0,75 kg	Anvendes forebyggende fra begyndende strækning.
Magnesium, svovl, mangan (og bor)	EPSO Microtop + MikroCare Mangannitrat + Spredklæbemiddel	3-5 kg + 1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Anvendes forebyggende fra begyndende strækning. Bor og svovl kan også have positive effekter ved begyndende blomstring. Spredklæbemiddel kan undlades hvis samtidig blanding med andre midler.



**Bor tilsættes PH Easy, hvis det blandes med andre midler. (0,1 liter/100 liter vand)**

## Ultima ProFF - Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer

ECostyles velkendte Pelargonsyre (Topgun), er blevet tilføjet et nyt spirehæmmende aktivstof- Maleinhydrazid. Ved behandling transporteres stoffet ind i planten, og hæmmer skuddannelse. Det skulle gi' forbedret effekt, hvis behandling udføres når ukrudtet er max 5 cm højt. Det er vigtigt at sørge for god dækning af ukrudtet, da Ultima PROFF er et kontaktmiddel. Behandling gentages ved genvækst fra rødder, når ukrudtet igen er 5 cm højt, for at opnå tilfredsstillende effekt. **Midlet må kun anvendes 2 gange/sæson**, men kan kombineres med brug af alm. pelargonsyre/Topgun.

### Doseringsvejledning.

Ukrudts størrelse	TopGun / Ultima Proff. Liter pr. 100 m <sup>2</sup>	
Højde	Åben bestand	Tæt bestand *)
2 - 5 cm	0,6	0,9
5 - 10 cm	0,8	1,2
Over 10 cm	1,1	1,66

\*) Ved tæt bestand forstås det at ukrudtets blade gensidigt skygger for hinanden. Mospuder (maks. 2 cm i højde) skal gennemvædes for bedste effekt.



Hilsen Møllespirerne

Karl Kudsk

Søren Jepsen

Tommy K. Pedersen