

Afgrødenyt nr. 5

10-04-2026

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Vækstregulering
- Isåning af vårsæd

Vækstregulering i vintersæd

Følgende forhold øger risikoen for lejesæd:

- blødstrået sort,
- tidlig såning,
- stor udsædsmængde,
- milde vintre,
- tidlig og stor kvælstoftildeling.

Vinterhvede. Oversigt over hvedesorternes tendens til lejesæd. Behov for vækstregulering bør altid vurderes individuelt. (Hver mark for sig).

Mest stråstive		Mindst stråstive
LG Initial, SY Revolution, LG Kermit, KWS Scope	Bright, HeerupPondus, RGT Stokes, NOS Bullseye, DLG Wheat Mix Top Yield, DLG Wheat Mix Top Bread, Bohr, NOS Elite Hvedemix 2510, NOS Robust Hvedemix 2520, RGT Hexton, KWS Brise, KWS Dawsum, KWS Danicum	Kvium, Champion, Pacman, Guinness, Kubik, NOS Medley, DLG Wheat Mix Everest, DLG Wheat Mix Robust

Vinterbyg. Oversigt over de mest udbredte vinterbygsorters tendens til lejesæd.

Mest stråstive		Mindst stråstive
	NOS Contador, Orgade, Organa, Alaska, SY Dakoota (6r, hyb), Annemiek, NOS Valverde, KWS Luddis, Virusfri Byg 25, DLG Barley Mix, SY Loona, LG Capitol, SY Chevioot, KWS Agilis, SY Dakoota, Paquita, SY Zoomba, SY Scoop, SY Galileo	SY Sparoo

Vinterrug. Oversigt over de mest udbredte rugsorters tendens til lejesæd.

Mest stråstive		Mindst stråstive
KWS Berado, KWS Tayo, SU Jelling, SU Glacia, KWS Rixor, SU Karlsson		KWS Receptor, KWS Igor, KWS Rotor, KWS Cursor, SU Arvalus, SU Bebop, SU Arvid

Løsninger i Vinterhvede og triticale. (Markbogen side 31)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Vækstregulering (obs. på trinexapacregler)			
Spiltbehandling ved bladstræde sorter og/ eller højt N-niveau / høj N-frugtelse m.v.	Opstart st. 30: Stabilan Extra + Moddus Start	0,5 ltr. + 0,15 ltr.	0,20 ltr./ha Moddus M kan indgå i stedet for 0,15 ltr./ha Moddus Start.
Husk ingen vækstregulering i brødhvede	Opfølgning st. 33-39: Moddus Start	0,25-0,30 ltr.	Stabilan Extra anvendes alene i første spiltbe- handling, hvis det samtidig er nødvendigt at tilsætte græsukrudtsmidler.
	eller Medax Top + Ammoniumsulfat	0,5-0,75 ltr. + 1,0 ltr.	Ved behandling skal afgrøden være i god vækst, og ikke være stresset som følge af kulde, tørke, næringsstofmangel m.v. Der må ikke sprøjtes i en periode med nattefrost.
Enkeltbehandling ved stråstærke sorter og/ eller lavt N-niveau / lav N-frugtelse m.v.	St. 31-33: Moddus Start	0,30 ltr.	Jo tidligere behandling i strækingsfasen, jo bedre effekt.
Husk ingen vækstregulering i brødhvede	eller Moddus M.	0,4 ltr.	Ved behandling skal afgrøden være i god vækst, og ikke være stresset som følge af kulde, tørke, næringsstofmangel m.v. Der må ikke sprøjtes i en periode med nattefrost.
	eller St. 33-37: Cerone + Moddus M.	0,2-0,3 ltr. + 0,2 ltr.	Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed og lys- intensitet. Morgensprøjtning anbefales, mens der ikke bør sprøjtes i stærk solskin midt på dagen.

Løsninger i Vinterbyg. (Markbogen side 40)

Vækstregulering (obs. på trinexapacregler)			
Spiltbehandling 6-radede sorter, herunder hybrider	Opstart st. 30-32: Moddus Start	0,2 ltr.	Ved behandling skal afgrøden være i god vækst, og ikke være stresset som følge af kulde, tørke, næringsstofman- gel m.v. Der må ikke sprøjtes i en periode med nattefrost.
	eller Moddus M.	0,3 ltr.	
1. spiltbehandling forebygger lejeseed/ strånedknækning.	Opfølgning st. 33-39: Cerone + Moddus M.	0,15-0,2 ltr. + 0,2 ltr.	Cerone anvendt alene i st. 39-49 forebygger kun aksnedknækning. Maks. 0,15-0,2 ltr./ha hvis risiko for tørkestress. Behandling med Cerone kan foretages sam- men med T2-svampebehandling.
2. spiltbehandling forebygger strå- og/eller aksnedknækning.	eller St. 39-49: Cerone	0,2-0,3 ltr.	
Enkeltbehandling 2-radede sorter	St. 31-33 Moddus Start	0,3-0,4 ltr.	Ved behandling skal afgrøden være i god vækst, og ikke være stresset som følge af kulde, tørke, næringsstofman- gel m.v. Der må ikke sprøjtes i en periode med nattefrost. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed og lysinten- sitet. Morgensprøjtning anbefales, mens der ikke bør sprøjtes i stærk solskin midt på dagen.
	eller Moddus M.	0,4-0,5 ltr.	
	St. 33-39 Cerone + Moddus Start	0,15-0,25 ltr. + 0,15 ltr.	I st. 33-39 kan 0,15 ltr./ha Moddus Start erstattes med 0,2 ltr./ha Moddus M.
	eller St. 39-49 Cerone	0,2-0,3 ltr.	

Løsninger i Vinterrug. (Markbogen side 34)

Vækstregulering (obs. på trinexapacregler)			
Splittbehandling, kraftige afgrøder, højt N-niveau / høj N-frigivelse Husk ingen vækstregulering i brødrug	Opstart st. 30: Stabilan Extra + Moddus Start	0,5 ltr. + 0,15 ltr.	0,2-0,3 Moddus M. kan anvendes istedet for Moddus Start. Husk at Moddus Start ikke må anvendes efter st. 33 i Vinterrug. Moddus M. må anvendes frem til st. 39, og skal således anvendes ved behov for opfølgning. Stabilan Extra anvendes alene i første splittbehandling, hvis det samtidig er nødvendigt at anvende græsukrudtsmidler.
	eller Moddus Start	0,25 ltr.	
Enkeltbehandling Husk ingen vækstregulering i brødrug	Opfølgning st. 33-39: Cerone + Moddus M.	0,2 ltr. + 0,2 ltr.	Ved behandling skal afgrøden være i god vækst, og ikke være stresset som følge af kulde, tørke, næringsstofmangel mv. Der må ikke sprøjtes i en periode med nattefrost. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed og lysintensitet. Morgensprøjtning anbefales, mens der ikke bør sprøjtes i stærk solskin midt på dagen.
	St. 31-33: Moddus Start eller St. 33-37: Cerone + Moddus M.	0,25-0,35 ltr. 0,2-0,3 ltr. + 0,2 ltr.	

Blandinger.

Græsukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler, kan kun i enkelte tilfælde blandes. Stabilan Extra kan bruges, men senest stadie 30. (Stadie 32 i rug).

Produkter	Atlantis/ Cossack/ Hussar	Broadway	Rexade	Primera super	Foxtrot	Serrate	Topik
Stabilan Extra Trece 750	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Cuadro NT Moddevo Moddus M Moddus Start Sonis Trimaxx M	(-)	-	-	(-)	-	(-)	(-)
Medax Max	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Medax Top	(-)	-	-	(-)	-	(-)	(-)
Cerone	-	-	-	-	-	-	-
Terpal	-	-	-	-	-	-	-

(+) Blandinger med færrest negative erfaringer. (-) Risiko for skader. – Blanding bør aldrig ske!.

Isåning af vårsæd

Herunder ses tabel over afgrødetolerance af isået vårsæd i pletter med udgået vintersæd, ved brug af græsukrudtsmidler. Nogle græsmidler kan give væksthæmning, udbyttetab, og andre må slet ikke bruges...

Middel	Isået vårbyg		Isået havre		Isået vårhvede	
	Før fremspiring	Efter fremspiring	Førfremspiring	Efter fremspiring	Førfremspiring	Efter fremspiring
Atlantis OD	Væksthæmning	Gulfarvning og udbyttetab	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Broadway / Rexade	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK
Cossaack OD	Væksthæmning	Gulfarvning og udbyttetab	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Hussar Plus OD	OK	OK	Må ikke benyttes	Må ikke benyttes	OK	OK
Serrate	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK
Topik	OK	Må ikke benyttes	OK	Må ikke benyttes	OK	OK

Hilsen Møllespirene

Karl Kudsk

Søren Jepsen

Tommy K.

Pedersen



Kålbrot i vinterraps. Til højre ses kålbrotolerant sort.