

Afgrødenyt nr. 7

12-05-2026

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.
- Svampebekæmpelse i vinterbyg, vinterrug og vinterhvede.
- Bygfluer i vårhvede.
- Indbydelse til markvandring den 27. maj hos JSJ Agro i Aabybro.

I pløjefrie sædskifter kan enårigt rapgræs bekæmpes med 0,1-0,15 liter Legacy/ha. indtil begyndende fremspiring. Supplerende/ bekæmpelse anbefales når ukrudtet har max 2 løvblade, og afgrøden er i stadie 14-21.

| Skadevolder Problem | Middel | Dosering pr. ha | Behandlingstidspunkt/ Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrudt | | | |
| Enårig rapgræs, stedmoder, ærenpris m.v. | Når jorden har sat sig men inden fremspiring: Legacy 500 SC Opfølgning med én af nedenstående løsninger. | 0,1 ltr. | Spilltbehandling anbefales ved meget enårig rapgræs og/eller pløjfri dyrkning. Uanset om man har anvendt Legacy 500 SC inden fremspiring eller ej, skal der følges op med én af nedenstående ukrudtsløsninger. |
| St. 20 Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt | Hussar Plus OD + Renol | 70 ml + 0,5 ltr. | Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved 70 ml/ha Hussar Plus OD, som er max. dosis i vårbyg. Til sætning af/opfølgning med 0,2-0,25 ltr./ha Pixxaro/Zypar vil øge effekten på besværlige tokimbladede arter og forebygge resistens. |
| St. 20-25 Alm. tokimbladet ukrudt | Express 50 SX + Primus XL + Spredekæbemiddel | 7 g + 0,3-0,4 ltr. + 0,15 ltr. | God løsning mod almindelige tokimbladede arter. Begrænset resistensforebyggende effekt. 0,25-0,3 ltr./ha Zypar kan anvendes i stedet for Primus XL. |
| St. 20-25 Storke-/hejrenæb, lægejordrøg, alm. brandbæger, valmue, hundepersille, resistent fuglegræs samt alm. tokimbladet ukrudt | Express 50 SX + Pixxaro EC | 7 g + 0,2-0,3 ltr. | God resistensforebyggende løsning og stærk mod besværlige arter. Anvend 0,3 ltr./ha Pixxaro hvis erkendt resistent fuglegræs. I perioder med varmt og tørt vejr og dermed ekstra vækst på ukrudtet, vil det være en fordel at tilsætte 0,15 ltr./ha spredekæbemiddel. |
| St. 21-25 Kornblomster, gul okseøjle, kamiller samt alm. tokimbladet ukrudt, resistent kamille (anvend højeste dosering) | Mustang Forte | 0,5-0,75 ltr. | OBS. Restriktioner for halm anvendelse og efterfølgende afgrøde - læs etiketten. Anvendes senest i st. 32. Kør tidligt mod gul okseøjle. Er der ikke behandlet med Legacy 500 SC inden fremspiring, bør der tilsættes 7 g/ha Ally 20 SX/Express 50 SX eller 0,03 ltr./ha Legacy hvis stedmoder og ærenpris. Kør i st. 30 for bedst effekt mod spildkartofler. Kør i st. 32 mod rod ukrudt, hvor alle rodskud er fremspirt. Der vil ofte være behov for målrettet opfølgning mod rod ukrudt og spildkartofler med glyphosat før høst (foderkorn) eller efter høst (kvalitetskorn) (efter gældende retningslinjer). Ved mange resistente ferskenpilleurter anbefales opfølgning med 0,35 ltr./ha Pixxaro EC 14 dage efter behandling med 0,75 ltr./ha Mustang Forte. |
| St. 30-32 Ovenstående og resistente ferskenpilleurter, agertidsler, gråbrynker og spildkartofler | Mustang Forte opfølgning efter 14 dage Pixxaro EC | 0,75 ltr. 0,35 ltr. | |
| St. 30-39 Tidsler, agerpadderok og andet rod ukrudt, agerkål, kornblomst, raps, mælde m.fl. | Metaxon + Ammoniumsulfat | 1,0 ltr. + 2,0 ltr. | Anvendes i strækingsfasen senest st. 39 ved temperaturer over 12°C. Følg målrettet op mod rod ukrudt før høst (foderkorn) eller efter høst (kvalitetskorn) med glyphosat (efter gældende regler). Glyphosat har dog ingen effekt mod agerpadderokke. |

Vårbyg uden udlæg (Markbogen side 43)

Det mest almindelige ukrudt klares normalt med **7 gram Express 50 SX+0,3 liter Primus XL/ha. Tilsæt også 1 liter mangannitrat + 0,15 liter SP 50/ha.** Hvis du har resistent fuglegræs, erstattes Primus XL med **0,3 liter Pixxaro/ha.** for at sikre en effektiv bekæmpelse. Pixxaro har også bedre effekt på storkenæb, hundepersille, lægejordrøg og valmue. Flyvehavre bekæmpes senest i stadie 30 med **0,8 liter Primera Super + 0,2 liter SP 50 / ha.** Senere kan tidsler, agerpadderok og andet rod ukrudt bekæmpes med **1 liter Metaxon + 2 liter Ammoniumsulfat / ha.** Senest i stadie 39

Vårbyg med græsudlæg uden kløver. (Markbogen side 47)

| Skadevolder Problem | Middel | Dosering pr. ha | Behandlingstidspunkt/ Bemærkning |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrudt | | | |
| I byg med udlæg af rajgræs og rødsvingel til frø samt i byg med udlæg af rent græs til foder eller efterafgrøder: Enårig rapgræs, alm. tokimbladet ukrudt | Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC Opfølgning: Express 50 SX + evt. Pfixaro | 0,1 ltr. 7 g + 0,2-0,3 ltr. | For at opnå bedst effekt mod enårig rapgræs anvendes 0,1 ltr./ha Legacy 500 SC inden fremspiring og gerne på fugtig jord. Opfølgning når udlægget er fuldt fremspiret og har 2-3 blade. Til sætning af 0,2-0,3 ltr./ha Pfixaro sikrer bekæmpelse af vanskelige arter som storkenæb, hundepersille, lægejordrog, valmue og resistent fuglegræs. Sidstnævnte kræver højeste dosis. |
| St. 20-25 Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Alm. tokimbladet ukrudt | Express 50 SX + Primus XL | 7 g + 0,25-0,4 ltr. | Når græsset er godt fremspiret og har 1-2 blade. Frøene skal være dækket af mindst en centimeter jord. |
| St. 21-32 Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Svinemælk, kombiomster, gul okseøjle, gråbynker, agertidsler samt alm. tokimbladet ukrudt | Mustang Forte + Express 50 SX | 0,5 ltr. + 7 g | Mustang Forte anvendes senest st. 32. OBS. Restriktioner for halm anvendelse og efterfølgende afgrøde - læs etiketten. Undgå behandling under meget varme og tørre forhold. |
| St. 20-25 Byg med udlæg af rødsvingel, engsvingel: Flyvehavre, vindaks og agerrævehale | Primera Super + Spredekæbemiddel | 0,8 ltr. + 0,15 ltr. | Anvendes senest i afgrødens st. 30 (afsluttende buskning) for at undgå afgrødeskade. |
| St. 32-39 Byg med udlæg af rent græs: Tidsler, agerpadderokker og andet rod ukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. | Metaxon + Ammoniumsulfat | 1,0 ltr. + 2,0 ltr. | Anvendes i strækningstiden og senest st. 39 ved temperaturer over 12°C. |
| Svampe, skadedyr og mikronæring: Se vårbyg uden udlæg. | | | |

Vårbyg med kløvergræsudlæg:

| Skadevolder Problem | Middel | Dosering pr. ha | Behandlingstidspunkt/ Bemærkning |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrudt | | | |
| Vårbyg med kløvergræsudlæg: Alm. tokimbladet ukrudt | Stomp CS + Basagran SG + Renol | 1,0 ltr. + 550 g + 0,5 ltr. | Basagran SG er eneste middel, som er fuldt skånsomt overfor kløver. Stomp SC kan være lidt hård overfor kløver. Frøene skal være dækket af jord og behandling bør afvente, at hovedparten af kløveren har udviklet første løvblad (spadebladet). Stomp SC kan udelades ved småt ukrudt og få fuglegræs og stedmoder. Til sætning af Renol/olie øger effekten overfor ukrudtet men reducerer samtidig skånsomheden overfor kløveren. |

Vårhvede uden udlæg:

| Skadevolder Problem | Middel | Dosering pr. ha | Behandlingstidspunkt/ Bemærkning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Ukrudt | | | |
| Ukrudt som i vårbyg uden udlæg - desuden kan nedenstående ukrudtskløning anvendes i vårhvede: | | | |
| Agerrævehale, rajgræs, flyvehavre, storkenæb, lægejordrog samt alm. tokimbladet ukrudt | Rexade 440 + PG 26N | 25-40 g + 0,5 ltr. | Højeste dosis mod storkenæb, flyvehavre og græsser. |

Ukrudt i havre:

Legacy 500 SC, Pixxaro, Primera Super og Hussar Plus OD må ikke bruges i havre! Overvej, pga. det tørre vejr, en tidlig behandling mod manganmangel inden ukrudtsbekæmpelsen udføres.

| Skadevolder Problem | Middel | Dosering pr. ha | Behandlingstidspunkt/ Bemærkning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrudt | | | |
| St. 20-25 Alm. tokimbladet ukrudt | Primus XL + Express 50 SX + Spredelæbemiddel | 0,3-0,4 ltr. + 7 g + 0,15 ltr. | Anvend højeste dosis Primus XL ved begyndende resistente fuglegræs. |
| St. 21-32 Gul okseøj, storkenæb, kornblomster, kamille, gråbynker, tidsler samt alm. tokimbladet ukrudt | Mustang Forte + evt. Ally 20 SX | 0,5-0,75 ltr. + 7 g | Mustang Forte skal anvendes senest i st. 32. Ally 20 SX senest i st. 30. Sidstnævnte tilsættes hvis mange gul okseøj, stedmoder og ærenpris. Anvend højeste dosis Mustang Forte hvis rod ukrudt eller begyndende resistent kamille. Kør tidligt mod gul okseøj. Kør sent mod rod ukrudt. OBS. Restriktioner for halmanvendelse og efterfølgende afgrøde – læs etiketten. |
| St. 20 Gul okseøj samt alm. tokimbladet ukrudt | Ally 20 SX + Metaxon | 15 g + 0,5 ltr. | Nødløsning mod gul okseøj, hvor Mustang Forte ikke kan anvendes pga. restriktioner. Sprøjt i st. 20, når gul okseøj har maks. 2 løvblade. |
| Agerpadderokker, tidsler, gråbynker | Metaxon + Ammoniumsulfat | 1,0 ltr. + 2,0 ltr. | Anvendes senest i st. 39. Kræver varmt vejr. Følg op målrettet mod rod ukrudt før høst (foderkorn) eller efter høst (kvalitetskorn) med glyphosat (efter gældende retningslinjer). Glyphosat har dog ingen effekt mod agerpadderokker. |

Svampebekæmpelse i vinterbyg.

Svampe i vinterbyggen kan bekæmpes ved begyndende skridning, sammen med lidt Cerone. **0,15-0,2 liter Cerone/ha i de 2- radede sorter, og 0,2-0,25 liter Cerone/ha. i de 6-radede. Afgrøden må ikke være tørkeramt.**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| St. 39-45 Skoldplet, blodplet, bygrus | Propulse SE 250 + Pictor Active + Spredelæbemiddel eller Propulse SE 250 + Comet Pro | 0,3-0,45 ltr. + 0,2 ltr. + 0,2 ltr. eller 0,35-0,5 ltr. + 0,2 ltr. | Anvend højst angivne dosis hvis behov for/ønske om forebyggelse af ramularia. |
| * Hussar Plus OD, Ally 20 SX og andre SU-midler må ikke anvendes i foråret, hvis Express 50 SX/Trimmer 5G eller andre SU-midler er anvendt i efteråret. | | | |

Hvis ikke man har Propulse til rådighed, kan plan på næste side med Prosaro benyttes.

Plan i vinterbyg uden Propulse.

| | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| St. 39-45 Skoldplet, bladplet, bygrust | Prosaro + Pictor Active + spredklæbemiddel | 0,5-0,6 ltr. + 0,2 ltr. + 0,2 ltr. | |
| | eller Prosaro + Comet Pro | 0,5-0,6 ltr. + 0,2 ltr. | |

OBS på triazolregnskabet i forhold til middelvej og dosis i de enkelte afgrøder.

Svampebekæmpelse i vinterrug.

I vinterrug kan der ligeledes køres omkring begyndende skridning med Prosaro eller Propulse + Comet Pro. Tilsæt **0,2 kg Lamdex / ha.** mod trips, hvis der er mere end 1 trips pr. strå. I kraftige afgrøder kan der tilsættes 0,2-0,25 liter Cerone pr. ha.

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. 49-59 Brunrust, skoldplet | Prosaro + Comet Pro | 0,25-0,4 ltr. + 0,2 ltr. | Maks. 2 behandlinger pr. sæson med Prosaro og Propulse SE 250. Der bør ikke sprøjtes i rug under blomstring af hensyn til forebyggelse af meldrøjer. Højeste dosis ved meget brunrust og ingen tidligere behandling. |
| | eller Propulse SE 250 + Comet Pro | 0,25-0,4 ltr. + 0,2 ltr. | |
| Skadedyr | | | |
| Trips | Lamdex | 0,2 kg | Bekæmpelse skal udføres lige før begyndende skridning i st. 45-49. Skadetærsklen er 1 mørk trips pr. bladskede. |



Trips i rug.

Svampebekæmpelse i vinterhvede.

Hveden er nu omkring stadiet 33-37, og fanebladssprøjtningen nærmer sig. Her er der også en plan **med** Balaya, og en plan uden. Pas på triazolregnskabet hvis du **ikke** råder over Balaya i år. I kraftige marker kan der suppleres med vækstregulering. (Se evt. Markbogen side 31).

Svampestrategi i hvede **MED** Balaya.

| Svampe jobs på triazolreglerne | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. 31-33 (T1) Septoria, gulrust og meldug | Proline EC 250 + evt. Comet Pro | 0,2-0,25 ltr. + 0,15 ltr. | T1 anvendes hvis gulrust og/eller risiko for septoria. Der tilsættes 0,1 ltr./ha Talius hvis samtidig meget meldug. |
| St. 39 (T2) Septoria, gulrust og moderat hvedebladplet (DTR) og meldug | 1. aksbeskyttelse Balaya 200 EW | 0,6-0,8 ltr. | Balaya må anvendes 1 gang pr. sæson og senest i st. 40. Anvend højeste dosis Balaya ved højt smittetryk af septoria. Hvis meget hvedebladplet (DTR) anvendes i stedet en blanding af Propulse + Balaya. |
| St. 53-61 (T3) Septoria, gulrust og brunrust | 2. aksbeskyttelse Propulse SE 250 + Orius Gold/Greteg Star | 0,3-0,4 ltr. + 0,2 ltr. | Orius Gold foretrækkes som blandingspartner til Propulse hvis meget gul- og/eller brunrust. Obs. på triazolregnskabet i forhold til middevalg og dosis i den samlede svampestrategi i hvede. |

Svampestrategi i hvede **UDEN** Balaya

| Vinterhvede | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| St. 31-33 (T1) Septoria, gulrust og meldug | Proline EC 250 + Comet Pro | 0,4-0,5 ltr. + 0,2-0,25 ltr. | Der tilsættes 0,1 ltr./ha Talius hvis der samtidig er meget meldug. |
| | eller Proline EC 250 + Juventus + (evt. Comet Pro) | 0,4-0,5 ltr. + 0,4-0,5 ltr. + 0,2 ltr. | |
| St. 39 (T2) Septoria, gulrust | 1. aksbeskyttelse Prosaro + Pictor Active + spredklæbemiddel + (evt. Juventus) | 0,6-0,75 ltr. + 0,2-0,25 ltr. + 0,2 ltr. + 0,4-0,5 ltr. | |
| St. 53-61 (T3) | 2. aksbeskyttelse Prosaro + Greteg Star + (evt. Pictor Active) + (evt. spredklæbemiddel) | 0,4-0,5 ltr. + 0,25-0,35 ltr. + 0,2-0,25 ltr. + 0,2 ltr. | |

Bygfluer i vårhvede

Hvis du dyrker vårhvede, bør du være opmærksom på angreb af bygfluer. Bygfluens hvide æg ses på billedet herunder.

Lamdex har en mindre anvendelse til bekæmpelse af bygfluer i vårhvede med op til 3 behandlinger fra primo maj til medio juni og maks. 0,6 kg/ha/vækstsæson. **Anvend 0,15 kg/ha.**

Da flyvningen kan strække sig over en længere periode, kan 2 behandlinger med ca. 10 dages mellemrum være aktuel. Ved erfaring for meget kraftige angreb, kan 3 behandlinger være aktuel.



Bygfluens hvide æg ses på blad.

Hilsen Møllespirene

Karl Kudsk

Søren Jepsen

Tommy K. Pedersen



Bygfluen er 4-5 mm lang

Kom med på

MARKVANDRING

Hos **JSJ AGRO**

Onsdag
d. 27 Maj 2026

Fra kl. 15.00



Birkelse Hovedgård
Kammerherrensvej 59
9440 Aabybro



Rundtur i marken

Afgang løbende mellem
15.00 - 17.00 med kørsel i
jagtvoгне



Derefter serveres

Helstegt pattegris
med tilbehør, øl og
sodavand



Se dig omkring

Se maskinparken og
bygningerne på Birkelse
Hovedgård


Hvad kan man se ?

På markvandringen er der fokus på resistente græsser, nye svampemidler og strategier i marken – samt kålbrok og praktiske erfaringer. Der vil være stationer med gennemgang af:

- Vinterbyg & vinterhvede • Raps •
- Vårsæd – byg, havre, hestebønner & ærter
- Grobund - Test af dyrkningssystem

Tilmeld dig på:

 97744311

 mm@mollerup.dk



Vi glæder os til at se jer