

Afgrødenyt nr. 8

12-06-2026

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Afsluttende svampebekæmpelse i vinterrug vinterhvede.
- Svampebekæmpelse i vårsæd.
- Ny "minor use" til Maister

Afsluttende svampebekæmpelse i Vinterrug.

I rugen kan brunrust bekæmpes snarest med: 0,3 liter Orius Gold/ha. (Senest stadie 69).

Vinterhvede.

Vinterhveden er nu skredet igennem, og bør beskyttes mod svampesygdomme den sidste tid frem mod høst. Septoria angrebene er forholdsvis svage, mens der er fundet gulrust angreb i enkelte sorter.

Triazolberegner.

På dette tidspunkt – før sidste svampebehandling i hveden, bør du tjekke hvor meget plads der er tilbage i dit triazolregnskab, så du holder dig under de 100 % sammenlagt over hele sæsonen. Vi vedhæfter en "Triazolberegner" i denne udgave af Afgrødenyt. Når du bruger den, er det vigtigt at de udførte behandlinger skrives under de rigtige udviklingsstadier. Propulse, Pictor Aktive og Comet pro tæller ikke i triazolregnskabet, og bør foretrækkes, hvis ikke der er plads til de "rigtige" triazoler.

Forbrug l/ha (ikke bejdset m. tebuconazol/difenoconazol)				
BBCH 30-32	BBCH 33-37	BBCH 38-40	BBCH 33-69	BBCH 38-69
			Difenoconazol	
			Amistar Gold / Greteg Star	
Tebuconazol	Tebuconazol			Tebuconazol
Orius Gold	Orius Gold			Orius Gold
Prosaro	Prosaro			Prosaro
Proline Xpert EC 240	Proline Xpert EC 240			Proline Xpert EC 240
Folicur Xpert EC 240	Folicur Xpert EC 240			Folicur Xpert EC 240
Mirador Forte EC	Mirador Forte EC			Mirador Forte EC
	Mefentrifluconazol	Mefentrifluconazol		
	Balaya	Balaya		

indtast de brugte midler under det rette udviklingsstadium i fanen: FORBRUG VINTERSÆD.

Ved denne sidste sprøjtning i **hvede** kan der anvendes: **0,25 – 0,3 liter Propulse + 0,25 – 0,3 liter Orius Gold/ha**. Ved fund af bladlus kan der tilsættes: **0,15 kg Lamdex/ha**. Hvis ikke man råder over Propulse, kan der anvendes: **0,4 liter Prosaro + 0,2 liter Pictor Aktive + 0,2 liter sprede-klæbemiddel/ha**.

Bemærk at sprøjtefristen for Propulse er stadie 61!

Bekæmpelsestærsklen for bekæmpelse af bladlus i korn er **25 % angrebne strå**.

Bekæmpelsestærsklen for bekæmpelse af kornbladbillens larve er **0,5 – 1 larve/aksbærende strå**.



Bladlus i hvede.



Kornbladbillens larve.

Triazol-regnskab	
Middel	Vintersæd
Difenoconazol	
Amistar Gold (1-233) / Greteg Star (1-284)	0,00
Narita (613-11)	-
Revus Top SC (1-218)	-
Tebuconazol	
Orius Gold (347-57)	0,24
Prosaro (18-667)	0,28
Proline Xpert EC 240 (18-666)	0,00
Folicur Xpert EC 240(18-665)	0,00
Mirador Forte EC (396-87)	0,00
Mefentrifluconazol	
Balaya (19-240)	0,40
Revyona (19-248)	-
I alt (%)	92,2

I fanen: TRIAZOL RESULTAT ses det samlede forbrug som skal være under 100 %

Svampebekæmpelse i vårsæd

Vårbyg.

Omkring begyndende skridning kan byggen beskyttes med: **0,25 – 0,35 liter Propulse + 0,2 liter Pictor Aktive + 0,2 liter sprede-klæbemiddel/ha.** Mod strå- og aksnedknækning kan **der tilsættes: 0,15 – 0,25 liter Cerone/ha.** alt efter hvor kraftig afgrøden er. Ved angreb af bladlus eller kornbladbillelarver tilsættes **0,05 kg Pirimor + 0,05 kg Kaiso Sorbie/ha.** Propulse kan erstattes af **0,3 liter Prosaro.**

Havre.

I havre kan der anvendes **0,1 liter Joust/Proline + 0,2 liter Orius Gold/ha.** Ved fund lus eller kornbladbillelarver **tilsættes 0,075 kg Kaiso Sorbie/ha.**

Ny minor use til Maister.

Maister må nu bruges mod ukrudt i havefrø samt spinat til frø.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af MaisTer (18-442) mod ukrudt i havefrø og markfrø inkl. spinat ved anvendelse af sprøjtning mellem rækkerne eller pletsprøjtning på friland. (Læs brugsanvisning).

Hilsen Møllespirerne

Karl Kudsk

Søren Jepsen

Tommy K. Pedersen