

Afgrødenyt nr. 10

04-09-2026

Denne meddelelse indeholder følgende emner:

- Ukrudt i vintersæd – efterår 2026

Ukrudt i vintersæd – efterår 2026

Efterårets midler til bekæmpelse af ukrudt vil primært være med de samme midler som sidste år, hvis man har sørget for at råde over de midler som har fået salgsforbud, og udgår sidst på året. Derudover er der et par ”nye” midler, som vi nok fremover kommer til at bruge.

- **Adimax (10 og 20 liter)** Adimax er en blanding af Boxer og Topik. Bruges ved opfølgning mod problemgræsser, efter brug af alm. Boxer, samt når sprøjtningen har været udsat og ukrudtet er blevet for stort.
- **Boxer 800 EC/Roxy EC (20 liter)** - Græsmiddel, som IKKE udgår, og hvor vi ikke ser problemer med resistens. Hvis Boxer skal bruges til ”Mindre anvendelse”, eller du vil følge op med Adimax, skal du bruge alm. Boxer – (10 liter). Bemærk at Boxer med aktivstoffet: **Prosulfocarb kan fordampe efter udsprøjtning**, hvis dagstemperaturen overstiger **15 grader**. Hvis det er tilfældet, bør du køre om natten, eller udsætte behandlingen til dagstemperaturen igen falder.
- **Fenix – (5 liter)** – Fenix indeholder aktivstoffet Aclonifen, som indtil nu har været den ene halvdel af Mateno Duo. Fenix er godkendt til brug i vintersæd med **0,58 liter pr ha.** i blanding med Boxer i stadie 10-11. Effekten på græsukrudt er lidt mindre end den vi kender ved brug af Mateno Duo. **Derfor bør dosis af Boxer øges lidt, her i efteråret.**
- **Legacy 500 SC (1 liter)** – Middel med 80 % jordmideleffekt og 20 % bladeffekt. **Midlet udgår, og restlager skal bruges senest 30-11-2026.**
- **Mateno Duo 600 EC (5 liter)** – mod bredbladet ukrudt. **Midlet er udgået, og restlager skal bruges senest 30-11-2026.**
- **Pico 750 WG (500 gram)** – ”Nyt” middel som er godkendt i vintersæd om efteråret stadie **11-12** og om foråret i stadie 25-29. Pico minder meget om Legacy, men har dog en lidt skarpere virkning, som betyder **at den ikke anbefales i blanding med Boxer**. Den har både jord- og bladeffekt, og kræver en god såteknik, hvor kernerne puttes ned i min. 4-5 centimeters sådybde. Derfor er den ikke så velegnet i rug og hybridvinterbyg. Løsninger med Pico 750 WG øger især effekten på agerstedmoder og ærenpris.
- **Roxy EC (20 liter)** – Identisk med Boxer 800 EC som indeholder Prosulfocarb.
- **Topik EC (5 liter)** – Topik har effekt på grove græsser såsom: Flyvehavre, Alm. rapgræs, Agerrævehale, Vindaks, Alm. rajgræs og Italiensk rajgræs. Kan anvendes sent efterår og forår.

Handelsnavn	Reg.nr.	Leverandør	afstandskrav til vandløb	afstandskrav til § 3-natur	afstandskrav til veje, beboelse og offentlige institutioner
Adimax 20 ltr (1)	1-228	Syngenta	10	0	0
Boxer 10 ltr (2)	1-211	Syngenta	10	0	0
Boxer 800 EC 20 ltr (1)	613-42	Syngenta	10	0	0
Fenix SC 600 5 ltr (4)	18-417	Bayer Crop	10	15	0
Legacy 500 SC 1 ltr. (12) MST forbud. Salg 28/02-26 Udløb 30-11-2026	396-26	Adama	10	0	0
Mateno Duo 600 SC 5 ltr (4) MST forbud. Salg 28/02-26 Udløb 30-11-2026	18-631	Bayer Crop	20	5	2
Roxy EC 20 ltr	613-5	Globachem	10	0	0
Topik 5 ltr	396-74	Adama	2	0	0
Pico 750 WG	19-171	BASF A/S	20	0	2

Vær opmærksom på midlernes afstandskrav.

Forslag til løsninger i vinterhvede og Triticale. (med Legacy og Mateno Duo)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 37-38			
Enårig rajgræs, vindaks, ildt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspining: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rajgræs og/eller pløjefri dyrkning. Anvendes Express 50 SX mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD. Se løvrigt løsning med Mateno Duo nedenfor.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Roxy EC + evt. Express 50 SX + Spredklæbemiddel	1,0-1,5 ltr. + 7 g + 0,15 ltr.	
Vindaks, enårig rajgræs, ildt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer 800 EC/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr.	Anvendes Express 50 SX som opfølgning mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU- midler om foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Express 50 SX + Spredklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	Der kan tilføres mangan og evt. middel mod bladius i st. 13 sammen med Express 50 SX efter behov.
Enårig rajgræs, vindaks, ildt rajgræs, spildraps, storke-/ hejrenæb, kornblomster, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller samt alm. tokimbla- det ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer 800 EC/Roxy EC	0,35-0,5 ltr. + 0,75-1,0 ltr.	Højeste angivne doser Mateno Duo hvis kornblomster. OBS. Maks. 0,35 ltr./ha Mateno Duo i vinterrug og vinterbyg. Mateno Duo må ikke blandes med Boxer 800 EC/Roxy EC i vinterrug og vinterbyg.
Alm.rajgræs (stor bestand), ital. rajgræs, væselhale, agerrævehale, vindaks, en- årig rajgræs, spildraps, storke-/hejrenæb, kornblom- ster, resistent fuglegræs, valmuer og kamiller samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 10-11: Mateno Duo + Boxer 800 EC/Roxy EC	0,5-0,7 ltr. + 1,0-1,5 ltr.	Anvend højest angivne doser Boxer 800 EC/ Roxy EC og Mateno Duo og følg op med Adimax/Topik EC hvis væselhale og/eller meget rajgræs.
	Opfølgning efter behov: Adimax + Topik EC + Renol	1 ltr. + 0,1-0,2 ltr. + 0,5 ltr.	Der skal være 10-14 dage mellem behand- lingerne med Boxer 800 EC og Adimax.Husk Adimax er ikke tilladt i Triticale.

Forslag til løsninger i vinterbyg (med Legacy og Mateno Duo)

Skadevolder Problem	Middel	Doseri ng pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt			
Enårlig rapgræs, vindaks, rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårlig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Anvend højeste doser Boxer 800 EC/Roxy EC hvis meget rajgræs og agerrævehale. Anvendes 7 g/ha Express 50 SX som opfølgning mod tokimbladet ukrudt, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Express 50 SX og Ally 20 SX til foråret.
	Opfølgning st. 11-12: Boxer 800 EC/Roxy EC + evt. Express 50 SX	1,0- 2,0 ltr. + 7 g	
Enårlig rapgræs, vindaks, lldt rajgræs, meget spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt alm. tokimbladet ukrudt	St. 9-10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterbyg og vinterrug skal Mateno Duo og Boxer 800 EC/Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 ltr./ha i disse afgrøder. Rette timing af behandlingen er vigtig. Anvend højeste doser Boxer 800 EC/Roxy EC hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Roxy EC	1,0- 2,0 ltr.	
Vindaks, enårlig rapgræs, lldt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer 800 EC/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0- 2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Anvend højeste doser Boxer 800 EC/Roxy EC hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Express 50 SX + Spredklæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	Anvendes 7 g/ha Express 50 SX som opfølgning mod tokimbladet ukrudt kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Hussar Plus OD, Express 50 SX og Ally 20 SX til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller luse-middel efter behov i den opfølgende behandling.
Skadedyr			
Bladlus	Kalso Sorble	0,07-0,1 kg	Ved fund eller varsel. Maks. 1 behandling pr. vækstår med Kalso Sorble.

Forslag til løsninger i vinterrug (med Legacy og Mateno Duo)

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Behandlingstidspunkt/ Bemærkning
Ukrudt - se anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af grove resistente græsser på side 37-38			
Enårig rapgræs, vindaks, lildt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvevand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig, men inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,12 ltr.	Spilbehandlingen anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Opfølgning med Boxer 800 EC/Roxy EC på kornets st. 11. Boxer 800 EC-/Roxy EC-dosis øges hvis udfordringer med besværlige græsarter som agerrævehale m.v. Anvendes Express 50 SX mod f.eks. spildraps kan der ikke anvendes SU-midler til foråret, herunder bl.a. Cossack OD.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Roxy EC + evt. Express 50 SX	1,0-1,5 ltr. + 7 g	
Enårig rapgræs, vindaks, spildraps, storke-/hejrenæb, resistent fuglegræs, valmuer, kamiller, hæmning af kornblomster samt lildt rajgræs, agerrævehale og væselhale	St. 10 (senest ved begyndende fremspiring): Mateno Duo	0,35 ltr.	I vinterrug og vinterbyg skal Mateno Duo og Boxer 800 EC/Roxy EC udbringes hver for sig. Mateno Duo kan være hård ved afgrøden, og der må maks. anvendes 0,35 l/ha i vinterrug og vinterbyg. Rette timing af behandlingen er vigtig. Højeste dosis Boxer 800 EC/Roxy EC ved meget rajgræs og agerrævehale.
	Opfølgning st. 11: Boxer 800 EC/Roxy EC	1,0-2,0 ltr.	
Vindaks, enårig rapgræs, lildt rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, tvevand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer 800 EC/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05 ltr.	Anvendes Express 50 SX mod f.eks. spildraps i efteråret, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Cossack OD til foråret. Der kan tilsættes mangan og/eller lusemiddel til Express 50 SX.
	Opfølgning st. 12-13: + evt. Express 50 SX + Spredelæbemiddel	7 g + 0,15 ltr.	
Rajgræs, agerrævehale, spildkorn af havre/vårbyg, enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigøj, fuglegræs, kamille, tvevand, ærenpris	St. 10-11: Boxer 800 EC/Roxy EC + Legacy 500 SC	1,5-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Mindst 2,0 ltr./ha Boxer 800 EC/Roxy EC for at forebygge resistens mod agerrævehale. Opfølgning i efteråret med Topik på nyfremspiret græsuksrudt/spildkorn af vårbyg/havre.
	Opfølgning st. 12-13: Topik + Renol	0,2 ltr. + 0,5 ltr.	

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo – Vinterhvede/triticales

Kræver altid en forårsopfølgning!

Skadevolder Problem	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	St. 10-11 Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1,5 ltr + 0,58 ltr.	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
	St. 12-14 Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol + evt. Adimax	0,1- 0,2 ltr + 0,5 ltr + 1 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale. Adimax må KUN anvendes i sekvens med Boxer (reg. nr 1-211). Er der anvendt Boxer 800EC/Roxy EC må der IKKE anvendes Adimax.
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	St. 11-12 Boxer 800 EC/Roxy EC + Pico	1,5 ltr + 40-80 g	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. rajgræs. Minimum sådybde 4-5 cm for at undgå afgrødeskade ved brug af Pico. OBS: Pico må IKKE blandes med Fenix.
	St. 12-14 Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol + evt. Adimax	0,1- 0,2 ltr + 0,5 ltr + 1 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale. Adimax må KUN anvendes i sekvens med Boxer (reg. nr 1-211). Er der anvendt Boxer 800EC/Roxy EC må der IKKE anvendes Adimax.

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo – Vinterbyg.

Kræver altid en forårsopfølgning!

Skadevolder		Dosering	
Problem	Middel	pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1 - 1,5 ltr 0,58 ltr	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC	1 - 1,5 ltr	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. Rajgræs.
	<u>St. 11</u> Opfølgning tokimbladet ukrudt. Pico 750 WG	30 - 40 g	Minimum 4-5 cm. sådybde. Pico anvendes solo i vinterbyg, må IKKE blandes med Boxer/Roxy pga. afgrødeskade. Anvendes IKKE ved udsigt til kraftig regn efter udsprøjtning.

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo – Vinterrug.

Kræver altid en forårsopfølgning!

Skadevolder		Dosering	
Problem	Middel	pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1,5 ltr + 0,58 ltr.	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol	0,2 ltr + 0,5 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale.
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC	1 - 1,5 ltr	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. rajgræs.
	<u>St. 11</u> Opfølgning tokimbladet ukrudt. Pico 750 WG	30 - 40 g	Minimum 4-5 cm. sådybde. Pico anvendes solo i vinterrug og tritcale, må IKKE blandes med Boxer/Roxy pga. afgrødeskade. Anvendes IKKE ved udsigt til kraftig regn efter udsprøjtning.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol	0,2 ltr + 0,5 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale.

Hilsen Møllespirene Karl Kudsk Søren Jepsen Tommy K. Pedersen