

HVILKEN BLANDING SKAL DU VÆLGE?

Blanding	Slæt Lav energi	Slæt Høj energi	Afgræsning Høj energi	Afgræsning Lav energi
HorseMax Slæt		✓	✓	
HorseMax Fiber	✓			✓
HorseMax Fiber Øko	✓			✓
HorseMax Fiber uden alm. rajgræs	✓			✓
HorseMax Solfaxi med urter	(✓)			✓
HorseMax Low med urter				✓

HorseMax Slæt er en højt ydende blanding, som med sin sammensætning egner sig bedst til slæt. I blandingen indgår sildige rajgræsser, timoté, hundegræs og engrapgræs. Rajgræsserne er udvalgt efter et lavt sukkerindhold. Gennem valg af bl.a. optimalt slæt tidspunkt kan sukkerniveauet holdes lavt. Blandingen kræver god jordbonitet og gødning for at yde maksimalt. For optimal etablering bør den ikke sås senere end midt i september.

HorseMax Fiber er en blanding, der egner sig både til slæt og afgræsning. Blandingen er især rig på struktur og protein. Takket være arter som strandsvingel og timoté opnås et lavt sukkerindhold og en god holdbarhed. Den egner sig til afgræsning pga. indholdet af engsvingel, rødsvingel og engrapgræs, som modstår hestens tråd og bid. Du kan også få HorseMax Fiber ProNitro, hvor strandsvinglen er coatet med ProNitro, hvilket medvirker til en hurtigere etablering. HorseMax Fiber tilbydes desuden økologisk. For optimal etablering bør den sås om foråret eller først i august.

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs er en blanding, der egner sig både til slæt og afgræsning. Blandingen er lavet til hesteejere, der efterspørger en græsblanding uden alm. rajgræs. Med arter som strandsvingel, timoté og hundegræs har græsset et lavt sukkerindhold, er rig på struktur og har god holdbarhed. Den egner sig til afgræsning pga. engsvingel, rødsvingel og engrapgræs, som modstår hestens tråd og bid. For optimal etablering bør den sås om foråret eller først i august.

HorseMax Solfaxi med urter er den alsidige blanding, som skaber mere biodiversitet i marken. Græsblandingen anvendes primært til afgræsning. Den indeholder urter som sneglebælg, kællingetand og cikorie, som plejer hestensfordøjelse. Bør sås forår eller først i august.

HorseMax Low med urter er en græsblanding, der er sammensat efter ønsket om lav vækst. Blandingen er i høj grad sammensat af langsomt voksende arter med udløbere. Man kan derfor forvente en tæt bund i græsmarken med lav tilvækst i græsset. Den egner sig til heste, hvor man ønsker relativt lavt energioptag. Den indeholder desuden urter som esparsette, humlesneglebælg, lancet vejrbred, kællingetand og lucerne.

Se sammensætningen af HorseMax- blandingerne på www.dlf.dk under landbrug.

NYHED

HORSEMAX

Det bedste græs til din hest

Heste stiller særlige krav til græsmarken. Det er vigtigt, at græsset har den rigtige kvalitet, og samtidig skal græsset kunne tåle kraftig nedgræsning.

I HorseMax-blandingerne har vi taget højde for netop kvalitet og holdbare græsser.

God etablering og vedligeholdelse af græsmarker er vigtigt for at opnå det bedste resultat. I denne folder finder du hjælp til at finde den rette frøblanding, og vi giver dig nogle grundlæggende tips til, hvordan du bedst muligt sørger og vedligeholder en græsmark med en HorseMax-blanding.



Forhandler:



DLF Seeds A/S
Højmevej 12
5250 Odense SV

Tlf.: 6317 1600
www.dlf.dk
agro@dlf.dk



DLF - 2023 Alle fotos i denne brochure er med copyright © af DLF. For brug af fotos bedes du kontakte DLF.



HORSEMAX

Etablering, eftersåning og valg af græs til din hest




GODT BEGYNDT



Forberedelse

Arealet gøres klar med en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. En gammel græsmark bør fræses før pløjning, og måske skal den eksisterende mark allerførst behandles med et ukrudtsmiddel, som fjerner alle planter - ikke mindst rod ukrudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.



Harvning

Marken harves i maks. 4-6 cm dybde for at jævne såbeddet. For optimal fremspiring er det vigtigt at bevare fugten i jorden. Pas derfor på med at harve for meget, da det kan udtørre jorden.



Tromling

På sandjord tromles umiddelbart efter med cement-tromle, mens lerjord tromles evt. med ring- eller knast-tromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så frøet ikke placeres for dybt, og der kan sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.



Gødning

Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger, når du doserer gødning.



Såning

I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme over for udtørring. Til såning er det derfor en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, gerne 8-10 grader, da det fremmer både spiring og rodvækst. Den bedste såtid er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august), og såningen skal ske straks efter jordbehandlingen.

Ved såning om foråret vælger mange at så græsfrø med vårbyg eller havre som dæksæd. Kornet sås først efterfulgt af tromling, og først herefter sås frøblandingen. Brug 60-80 kg vårsæd pr. ha. Dæksæden kan høstes som grønkorn eller helsæd til wrap/ensilage eller som modent korn.

ETABLERING

Græsfrøene i sækken har forskellig størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele arealet. Såning må ikke ske dybere end ca. 1 cm.

Anbefalet udsædsmængde fremgår af vores hjemmeside www.dlf.dk under Landbrug.



Første benyttelse

Græsset er klar til benyttelse, når det er vokset godt til og er blevet 10-15 cm højt. Græsplanternes rodnet er dog endnu ikke fuldt udviklet og stærkt nok til at kunne klare stor belastning af arealet.



Første gang arealet anvendes er det derfor en god idé at anvende marken til slæt, wrap eller hø, da de unge planter ikke tåler færdsel fra græssende dyr. Afræsning skal ske med forsigtighed på den nye græsmark, så dyrene ikke ødelægger planterne. Efter første anvendelse gødes marken, og når græsset er vokset til 8-12 cm, er marken klar til normal afræsning.

Sukkerindholdet i græs påvirkes af flere faktorer:

- Vælg de rigtige græsser. Strandsvingel, timoté, hundegræs og engsvingel har lavt indhold af sukker
- Ved solrige dage og kolde nætter ophobes mere sukker i græsset
- Sukkerindholdet er typisk lavest om morgenen og stiger i løbet af dagen
- Under tørke kan væksten gå i stå, hvilket kan resultere i højere sukkerindhold i græsset



VEDLIGEHOLDELSE



Eftersåning

Udbytte og kvalitet falder i græsmarker med tiden, så det er en god idé at vedligeholde og holde liv i marken med eftersåning. Det bør ske f.eks. hvert 2. år - tidligt forår eller i august. Udsædsmængde: 15-20 kg pr. ha.



Strigling

Lige før eller samtidig med eftersåningen skal marken strigles kraftigt. Striglingen fjerner eventuelle døde blade og andre plantedele og skaber et tyndt lag af løs jord, som kan danne såbed for de nye frø.



Tromling

Eftersåningen afsluttes med tromling. Herved trykkes frøene fast mod jorden og vil spire lettere, fordi de er kommet i kontakt med den fugtige jord. Samtidig trykkes eventuelle sten tilbage i jorden.



Vanding

Det er en god idé at foretage eftersåningen i en fugtig periode eller forud for regnvejr. Hvis det er muligt, kan marken naturligvis også vandes efter såningen.



Gødning

Marken gødes, når det nye frø er spiret frem. Her anvendes samme NPK-gødning som ved anlæg af ny græsmark. Følg anbefalingerne på emballagen ved dosering af gødning.



Første benyttelse

Efter 4-6 uger er marken igen klar til brug. Start med forsigtig afræsning, så dyrene ikke træder de spæde nye planter itu eller nedgræsser dem så kraftigt, at planterne dør. Vær klar til at flytte dyrene efter nogle dage let afræsning.