

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo

Vinterhvede

Kræver altid en forårsopfølgning

Skadevolder		Dosering	
Problem	Middel	pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1,5 ltr + 0,58 ltr.	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol + evt. Adimax	0,1- 0,2 ltr + 0,5 ltr + 1 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale. Adimax må KUN anvendes i sekvens med Boxer (reg. nr 1-211). Er der anvendt Boxer 800EC/Roxy EC må der IKKE anvendes Adimax.
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	<u>St. 11-12</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Pico	1,5 ltr + 40-80 g	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. rajgræs. Minimum sådybde 4-5 cm for at undgå afgrødeskade ved brug af Pico. OBS: Pico må IKKE blandes med Fenix.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol + evt. Adimax	0,1- 0,2 ltr + 0,5 ltr + 1 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale. Adimax må KUN anvendes i sekvens med Boxer (reg. nr 1-211). Er der anvendt Boxer 800EC/Roxy EC må der IKKE anvendes Adimax.

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo

Vinterbyg

Kræver altid en forårsopfølgning

Skadevolder		Dosering	
Problem	Middel	pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1 - 1,5 ltr 0,58 ltr	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC	1 - 1,5 ltr	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. Rajgræs.
	<u>St. 11</u> Opfølgning tokimbladet ukrudt. Pico 750 WG	30 - 40 g	Minimum 4-5 cm. sådybde. Pico anvendes solo i vinterbyg, må IKKE blandes med Boxer/Roxy pga. afgrødeskade. Anvendes IKKE ved udsigt til kraftig regn efter udsprøjtning.

Alternativ Sprøjteplan Uden DFF og Mateno Duo

Vinterrug og triticales

Kræver altid en forårsopfølgning

Skadevolder		Dosering	
Problem	Middel	pr. ha	Bemærkninger
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, ital. rajgræs (agerrævehale)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC + Fenix	1,5 ltr + 0,58 ltr.	Bred løsning på tokimbladet ukrudt og græsser. God effekt mod ital. rajgræs.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol	0,2 ltr + 0,5 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale.
Tokimbladet ukrudt , enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale (ital. rajgræs)	<u>St. 10-11</u> Boxer 800 EC/Roxy EC	1 - 1,5 ltr	Højeste dosis ved store mængder af agerrævehale. Moderat effekt på ital. rajgræs.
	<u>St. 11</u> Opfølgning tokimbladet ukrudt. Pico 750 WG	30 - 40 g	Minimum 4-5 cm. sådybde. Pico anvendes solo i vinterrug og triticales, må IKKE blandes med Boxer/Roxy pga. afgrødeskade. Anvendes IKKE ved udsigt til kraftig regn efter udsprøjtning.
	<u>St. 12-14</u> Opfølgning efter behov: Topik EC + Renol	0,2 ltr + 0,5 ltr.	Ved stor bestand af resistent rajgræs og/eller agerrævehale.